

# 獸醫

## 猪患傳染性肺炎

### 應隔離注意管理

【問】：我養有四十多頭肉猪，時常因其中有一頭咳嗽，而使整羣猪都遭感染，但受感染的猪，咳嗽的時間長短不一，經過一段時間，就漸漸的發生呼吸困難，變成肺炎，約經過四個月長時間的咳嗽，就漸漸的痊癒了。請問有何藥物可以治療，應如何預防其發生？（桃園廣竹鄉新興村一〇八號賴振能）

【答】：來信所稱猪的咳嗽及其傳染情形，似為猪傳染性肺炎。此病近年在臺灣已證實存在。其原因為一種病毒，如有其病原，即病猪與猪羣，則其他猪隻容易受感染，但死亡很少，所受的影響為生長緩慢飼料利用率低，遂致經濟上損失甚大。

此病目前尚無有效藥品可應用，唯可給予抗生素，以防其他細菌性肺炎（肺疫）發生，並注意猪舍溫度。保持乾燥與通風（但要防賊風），飼料養分的平衡和衛生管理，且同時須預防蛔蟲寄生。如本病初發時期，把病猪隔離或撲殺，可免傳播病毒。（林本欽）

## 小猪白痢可預防

### 咳嗽多為氣管炎

【問】：（在來母猪，已留用數年，最近連產三胎小猪都會咳嗽，是何病症？應用何藥治療？）

【答】：（一）本地母猪連產三胎小猪均咳嗽等。可能因病毒引起之傳染性肺炎，或傳染性細菌（多為巴氏桿菌）所引起之氣管炎或肺炎（支氣管肺炎）。本病必須早期治療，不然轉變成慢性，治療困難。可用鏈黴素或磺胺劑治療，並可併用治咳嗽藥品。

【答】：（一）本地母猪連產三胎小猪均咳嗽等。可能因病毒引起之傳染性肺炎，或傳染性細菌（多為巴氏桿菌）所引起之氣管炎或肺炎（支氣管肺炎）。本病必須早期治療，不然轉變成慢性，治療困難。可用鏈黴素或磺胺劑治療，並可併用治咳嗽藥品。

【答】：（一）本地母猪連產三胎小猪均咳嗽等。可能因病毒引起之傳染性肺炎，或傳染性細菌（多為巴氏桿菌）所引起之氣管炎或肺炎（支氣管肺炎）。本病必須早期治療，不然轉變成慢性，治療困難。可用鏈黴素或磺胺劑治療，並可併用治咳嗽藥品。

料，均可使小猪發生白痢。（白天與晚間之氣溫差太大）或下雨等，亦均會發生白痢。

【預防此種病，要注意每次分娩前須將猪舍洗刷乾淨，並用克來蘇（三多）消毒。母猪分娩前以肥皂水洗刷，才可進入分娩舍。猪舍盡量保持乾燥，糞便每日打掃乾淨。氣溫低時（低於二十度）應該使用保溫箱或保溫燈，猪舍內放少量新鮮泥土，讓小猪吃玩，有加強預防作用。（張聯欣）

## 害蟲病

### 防治洋菇白皮病

#### 「苦氣水」「必速滅」

【問】：寄上洋菇堆肥，請鑑定內中何種病蟲害？為何洋菇不生長？（桃園平鎮鄉南勢村三六號徐立生）

【答】：送來洋菇堆肥標本，經鑑定有「白皮病」與「褐皮病」兩種孢子。此兩種病，均容易在微酸性而潮濕之堆肥中生長繁殖，防治最有效方法是在堆肥進床前，用「苦氣水」燻蒸。但現已播種洋菇，只有保持舍內之乾燥，並立刻使用「必速滅」，每一百斤土壤用二十克處理。並調整土壤PH為八。〇覆蓋之，即可改善。（杜自強）

## 卉花

### 佳多麗亞蘭在春季分株

#### 施用豆餅水須經過發酵

【問】：（一）請問佳多麗雅屬的蘭花，用豆餅施肥是否可以？如何分株栽培？（臺南市公園路二七七號徐永清）

【答】：（一）佳多麗亞蘭之蘭花，可以用豆餅，但須特別注意二點：  
（1）將豆餅打碎加水密封缸中，夏天約三個月，其他季節五個月，使充分腐熟發酵。  
（2）用發酵豆餅水的上澄液（缸內上部清淨的豆餅液），加水一千倍稀釋後施用，每三、四個月施用一次。

【答】：（一）佳多麗亞蘭之蘭花，可以用豆餅，但須特別注意二點：  
（1）將豆餅打碎加水密封缸中，夏天約三個月，其他季節五個月，使充分腐熟發酵。  
（2）用發酵豆餅水的上澄液（缸內上部清淨的豆餅液），加水一千倍稀釋後施用，每三、四個月施用一次。

品出廠工化發合永

# 牌角三

## 品質



## 保證

料肥合綜

# 農作物的大補品

是氮、磷、鉀的綜合製品  
是鈣、鎂、鈣的綜合製品  
省時！省力！省錢！

粒狀肥料 施用簡便  
肥效持久 改良土壤

農林廳農肥字第〇〇一四號登記  
電話：二七五五、二七五三四

號九巷六十段一街昌武市北臺

【問】：（一）適合何種土質？用何種肥料？（二）何時最適合下種？（臺中縣烏日鄉三和村中山路二二六之八何森）

【答】：（一）本省常見的百合，有下列幾種：  
（1）高砂百合：在臺灣各地山野有野生種，經濟栽培價值不大。  
（2）鐵炮百合：觀賞價值高，需要量也多，又適合本省中部栽培。如能利用促成栽培法，使其在聖誕節或新年元旦開花，即可高價售出。  
（3）新鐵炮百合：木種為高砂百合與鐵炮百合的種間雜種。到達一定大小即會開花，不需複雜的促成操作。

【問】：（一）適合何種土質？用何種肥料？（二）何時最適合下種？（臺中縣烏日鄉三和村中山路二二六之八何森）

【答】：（一）本省常見的百合，有下列幾種：  
（1）高砂百合：在臺灣各地山野有野生種，經濟栽培價值不大。  
（2）鐵炮百合：觀賞價值高，需要量也多，又適合本省中部栽培。如能利用促成栽培法，使其在聖誕節或新年元旦開花，即可高價售出。  
（3）新鐵炮百合：木種為高砂百合與鐵炮百合的種間雜種。到達一定大小即會開花，不需複雜的促成操作。

【問】：（一）適合何種土質？用何種肥料？（二）何時最適合下種？（臺中縣烏日鄉三和村中山路二二六之八何森）

【答】：（一）本省常見的百合，有下列幾種：  
（1）高砂百合：在臺灣各地山野有野生種，經濟栽培價值不大。  
（2）鐵炮百合：觀賞價值高，需要量也多，又適合本省中部栽培。如能利用促成栽培法，使其在聖誕節或新年元旦開花，即可高價售出。  
（3）新鐵炮百合：木種為高砂百合與鐵炮百合的種間雜種。到達一定大小即會開花，不需複雜的促成操作。

【問】：（一）適合何種土質？用何種肥料？（二）何時最適合下種？（臺中縣烏日鄉三和村中山路二二六之八何森）

【答】：（一）本省常見的百合，有下列幾種：  
（1）高砂百合：在臺灣各地山野有野生種，經濟栽培價值不大。  
（2）鐵炮百合：觀賞價值高，需要量也多，又適合本省中部栽培。如能利用促成栽培法，使其在聖誕節或新年元旦開花，即可高價售出。  
（3）新鐵炮百合：木種為高砂百合與鐵炮百合的種間雜種。到達一定大小即會開花，不需複雜的促成操作。