

點要培栽

木

花

賞

觀

• 薄紹楊 •

灌木、小喬木或較大喬木的花、葉等，可供吾人觀賞的，就可稱它為觀賞花木。在臺灣的觀賞花木，種類繁多，栽培容易，當正發展觀光事業的今天，觀賞花木實為國人所必需，所以臺灣觀賞花木在園藝的觀賞價值上，已佔着最重要的位置。

一般說來，以觀葉為主的如龍柏等，以花觀賞為主的如茶花等，那些植物，在大的公園，或小的園庭，都認為是不可缺少的觀賞花木，也是極為高貴的庭園佈置材料。在陽明公園裏，有着五百株茶花園的栽培，使那裏增加了不少的美麗風光。石門水庫的公園裏，亦擬在今年冬以二千至三千株的茶花樹，栽培茶花山，此一工作如能完成，將為石門水庫帶來更多的觀光價值。

臺灣氣候適宜，對於花木的種植，除了炎熱的夏季不適宜於栽培外，其他的季節，可以說都是花木的栽植適期。不過由於樹種的不同，不過由於樹種的不同，還是有着差異的。如茶花，由十一月開始到次年的三月都可種植，但是新芽一經發生，便應停止種植的工作。

觀賞花木的栽培，須要注意的地方很多，筆者特為選擇比較重要的地方，例如所需土壤，如何種植，繁殖方法，和簡要管理等分別介紹如下：

栽培花木要好土

觀賞花木是要生長在排水良好的土壤內，才會生育得良好，細沙質壤土、沙質壤土、黏質壤土都

是美好而肥沃的土壤。如果排水不良，或土壤的物理性質不好，那麼觀賞花木的栽培是很難成功的。因此，土壤對於觀賞花木，是一個特別值得重視的問題。至於排水不良的土壤，應該予以改良，否則不能收到花木栽培成功的效果。

土壤的改良方法，有挖水溝法、地下排水法以及其他任何可以降低地下水位的方法，如平常所採用的藥畦等都是，不過土壤的表土物理性須要弄好。至於弄好土壤物理性的有效辦法，是把泥炭糞土堆肥，混入在表土內。通常過黏質的土壤，要加拌一些適量的沙土，如為過沙質土壤，則可混入一些適量的黏土。土壤中的生物如蚯蚓，是改良土壤物理性很好的小動物，所以必須加以愛護，使它在土壤中，有疏鬆土壤的功能。

觀賞花木生長的土壤很差的，可用下法改良：即在植物體四到五寸的地方，挖穴洞，然後填上肥料與土壤的混合物，在栽植花木時，最好填上一份泥炭一份土壤的混合物。用鋤屑拌在土中亦可改良土壤，但是過量施用鋤屑的話，則往往使植物缺乏養分及濕度不夠，所以施用時需加注意。

栽培觀賞花木，往往因土壤的反應不合適而使栽培失敗。因為土壤的反應，對於作物非常重要；它能限制土壤中的可用養分。一般的觀賞花木，所需的酸鹼值是在五·五到六·五之間，所以當酸鹼值過低，或低於五，可能會呈現缺鐵的病症，亦可能呈現出鋁的毒害，而酸鹼值高於六·五時，則所植花木也會呈現出缺鐵的病症。

春秋冬天都可種

扦插生根後的花木，二、三年生時，需要移植。移植的工作，在臺灣北部地區，最好是在雨季進行，如陽明山等地，應在此時期施行移植，不但容易成活，而且可以省去很多的灌水時間，這在花木

可馬林系安全殺鼠劑

強力殺鼠餌 固型
テトラット



使用簡便
人畜無害
藥房均售

優點 本劑對於老鼠具有特異強度的毒性，老鼠如果吃下此藥，必然眼球出血，為尋求光亮一定走出屋外而死，而且合乎衛生。




臺灣總經銷：新瑞安行

台北市漢口街一段一三八號

電話：23804·34152

日本帝國製藥株式會社榮譽出品



的栽培經營上，是有利的。

移植的距離，一般以八寸為限，但經種植至六、七年生時則需定植，此定植時的距離，則以三尺三寸為限。至於所掘取穴的大小，宜依花木品種和其植株大小而定。經種植後，必須緊緊。

種植時間以春季為宜，但在臺灣的花木種植時期，除了夏季不作種植外，其餘的春、秋、冬天，都可施行觀賞花木的種植工作。

觀賞花木的繁殖，在臺灣大多數的花木，都是採用扦插的方法，如三光柏、杜鵑花等。也有用播種法的，如大頭茶、楊桐等。還有用壓條方法的，如桂花等。也有用嫁接的方法，如玫瑰等。不過一般說來，花木培育採用扦插繁殖的為多。扦插法先要選生育健壯的母樹後，剪取它一、二年生支條，長度普通為四寸左右，頂端保留二至五葉，下部的葉完全除去，扦插在正好的土壤內，而後給以適當的管理，如灌水、遮蔭、除草等。

早晚灌水和遮蔭

一般的花木是需要濕潤的，因此灌水是一件很重要的工作。當你種植了花木以後，主要任務是灌水。春、秋時節，每週灌水二次。冬天的時候，每週灌水一次。但到炎熱的夏季，植株發育旺盛，需要水分較多，因此在五至八月間，更需要多灌水。

幼苗是每天一次，還需遮蔭。盆栽每天需灌水一次，並宜把盆放在蔭棚下，如杜鵑、榕樹等。同時在夏天的灌水，以噴洒方式為好，施用時間，乃在清早或傍晚為宜。

各種花木幼苗，須以遮蓋物遮蓋如竹簾、草簾，這樣才不會受到陽光的強烈照射，有助於花木生育。一般說來，五至八月期間，烈日當空，氣候炎熱，花木的遮蔭，特別要緊。不過遮蓋物至下午五時或六時以後，當即除去，使它夜間能得到露水，有利於幼苗的生長。至於花木的幼苗以及盆植植物的主要遮蔭時間，簡述如下：

三至四月間：上午十一時至下午三時。
四至五月間：上午十時至下午四時。
五至六月間：上午九時至下午五時。
七至八月間：上午九時至下午六時。
九月間：上午十時三十分至下午四時。
十月以後可不必遮蓋。

施肥修剪和摘心

施肥：觀賞花木的施肥，通常以十二月及次年的三、四月間兩次施用。肥料施用的種類以氮素的肥料為主，如尿素、硫酸銨等。當然這些肥料對於花木的生長有效，不過要注意所施用的分量，如用量過多，植株會發生不良後果。如豆餅、人糞尿、

堆肥等的施用，不但可以促進花木的生育，而且也很安全。

修剪：一般的花木，都須要加以修剪的，因為修剪不但可以促進下部枝葉的發生，而且對於整株樹木的姿態，有着很好的影響，尤其是關於發育旺盛的樹種如榕樹，更須要給以較多的修剪，才會提高植株的美觀。如為盆植，不但須時加修剪，而且還需要以誘引的方法，使它樹木的枝條彎曲，增加盆景的美姿。而盆栽是大自然的樹木，引用在盆上表現美觀的，因此樹木各部份的配合非常重要，而花、葉的大小及枝條的配合，就須要選擇是否適宜於盆栽。在臺灣常用的盆景花木：如榕樹、九重葛等，都是很好的盆植花木。

摘心：有的花木栽培是需要施行摘心的。如杜鵑，當它生長至二年生時，如果給以摘心，則可促進其側枝的生長，有助於植株姿態的優美，尤其作盆植的時候，更需要作摘心的工作。

豐年曆書訂正

本（二）月五日立春，並慶祝農民節。五十七年豐年曆書十四頁，二月份月曆中，農民節誤排在四日欄下，請即訂正。

省府農林廳農藥登記證農藥字第一〇六四號
強力開路生乳劑稀釋一、〇〇〇倍至二、〇〇〇倍，即可強而有效的防治各種作物紅蜘蛛。

台灣總代理：
青象貿易有限公司

台北市漢口街壹陸肆肆號深壹堂室
電話：三六一七七

現貨供應處：

正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉草湖路二號
電話：霧峰六三三號、二六三三號

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

寄即索函書明說



ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA U.S.A.

KELTHANE[®] MF

用量少 · 藥效強！
強力開路生乳劑

防治紅蜘蛛

