

的栽培經營上，是有利的。

移植的距離，一般以八寸為限，但經種植至六、七年生時則需定植，此定植時的距離，則以三尺三寸為限。至於所掘取穴的大小，宜依花木品種和其植株大小而定。經種植後，必須緊緊。

種植時間以春季為宜，但在臺灣的花木種植時期，除了夏季不作種植外，其餘的春、秋、冬天，都可施行觀賞花木的種植工作。

觀賞花木的繁殖，在臺灣大多數的花木，都是採用扦插的方法，如三光柏、杜鵑花等。也有用播種法的，如大頭茶、楊桐等。還有用壓條方法的，如桂花等。也有用嫁接的方法，如玫瑰等。不過一般說來，花木培育採用扦插繁殖的為多。扦插法先要選生育健壯的母樹後，剪取它一、二年生支條，長度普通為四寸左右，頂端保留二至五葉，下部的葉完全除去，扦插在正好的土壤內，而後給以適當的管理，如澆水、遮蔭、除草等。

### 早晚澆水和遮蔭

一般的花木是需要濕潤的，因此澆水是一件很重要的工作。當你種植了花木以後，主要任務是澆水。春、秋時節，每週澆水二次。冬天的時候，每週澆水一次。但到炎熱的夏季，植株發育旺盛，需要水分較多，因此在五至八月間，更需要多澆水。

幼苗是每天一次，還需遮蔭。盆栽每天需澆水一、二次，並宜把盆放在蔭棚下，如杜鵑、榕樹等。同時在夏天的澆水，以噴灑方式為好，施用時間，乃在清早或傍晚為宜。

各種花木幼苗，須以遮蓋物遮蓋如竹簾、草簾，這樣才不會受到陽光的強烈照射，有助於花木生育。一般說來，五至八月期間，烈日當空，氣候炎熱，花木的遮蔭，特別要緊。不過遮蓋物至下午五時或六時以後，當即除去，使它夜間能得到露水，有利於幼苗的生長。至於花木的幼苗以及盆植植物的主要遮蔽時間，簡述如下：

- 三至四月間：上午十一時至下午三時。
- 四至五月間：上午十時至下午四時。
- 五至六月間：上午九時至下午五時。
- 七至八月間：上午九時至下午六時。
- 九月間：上午十時三十分至下午四時。
- 十月以後可不必遮蓋。

### 施肥修剪和摘心

施肥：觀賞花木的施肥，通常以十二月及次年的三、四月間兩次施用。肥料施用的種類以氮素的肥料為主，如尿素、硫酸銨等。當然這些肥料對於花木的生長有效，不過要注意所施用的分量，如用量過多，植株會發生不良後果。如豆餅、人糞尿、

堆肥等的施用，不但可以促進花木的生育，而且也很安全。

修剪：一般的花木，都須要加以修剪的，因為修剪不但可以促進下部枝葉的發生，而且對於整株樹木的姿態，有着很好的影響，尤其是關於發育旺盛的樹種如榕樹，更須要給以較多的修剪，才會提高植株的美觀。如為盆植，不但須時加修剪，而且還需要以誘引的方法，使它樹木的枝條彎曲，增加盆景的美姿。而盆栽是大自然的樹木，引用在盆上表現美觀的，因此樹木各部份的配合非常重要，而花、葉的大小及枝條的配合，就須要選擇是否適宜於盆栽。在臺灣常用的盆景花木：如榕樹、九重葛等，都是很好的盆植花木。

摘心：有的花木栽培是需要施行摘心的。如杜鵑，當它生長至二年生時，如果給以摘心，則可促進其側枝的生長，有助於植株姿態的優美，尤其作盆植的時候，更需要作摘心的工作。

### 豐年曆書訂正

本(二)月五日立春，並慶祝農民節。五十七年豐年曆書十四頁，二月份月曆中，農民節誤排在四日欄下，請即訂正。

省府農林廳農藥登記證農藥字第一〇六四號  
強力開路生乳劑稀釋一、〇〇〇倍至二、〇〇〇倍，即可強而有效的防治各種作物紅蜘蛛。

青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段肆肆號深壹壹室

電話：三六一七七

現貨供應處：


正豐化學股份有限公司

台中縣霧峰鄉草湖路二號

電話：霧峰六三號、二六三號

\*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

寄即索函書明說



ROHM AND HAAS  
PHILADELPHIA  
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA U.S.A.

**KELTHANE<sup>\*</sup> MF**

**用量少 · 藥效強！**

**強力開路生乳劑**

**防治紅蜘蛛**