

農友經驗



我的養兔經驗

(一)場地：只要光線充足，空氣流通，位置不太潮濕即可。如果作為副業，可利用走廊或屋簷下飼養。如飼養在露天處，最好利用樹蔭，但應特別注意的是：

①兔箱上面必須加蓋，以防禦風雨。②位置最好是沙質、排水良好、不易潮濕的地方。

(二)繁殖：種兔成熟時期，雖因品種、體型、氣候、及飼料等關係不同，就一般來講，雌兔出生後約六個月，雄兔約八個月即可進行交配，交配後經過三十一天左右分娩。如果產後三天再進行交配，這樣一年大約可育八、九胎。

如此作法，不但母兔易於衰弱，即幼兔發育也多不良，故最合理的繁殖，即分娩後四十天再交配，幼兔經四十五天離乳，控制使其一年繁殖五次，如此不但能保持優良品種且可使幼兔體格健全，發育良好。

(三)管理：①母兔於分娩前三至四天，一般食慾均有減退狀態，但對於水的需要量反增加，故此時應注意充分供給清水，以免分娩時因口渴而引起噉食小兔的惡癖。②倘若分娩時過於寒冷，要注意施與人工保溫(如用麻袋蓋住兔箱等)，以免幼兔凍死。③初生小兔，千萬不要用手任意的捉摸，因母兔的嗅覺非常靈敏，經用手

捉摸過的幼兔，母兔因感有特殊不同的氣味，會將幼兔咬死或不餵飼幼兔。如非要用手捉摸幼兔不可，必須戴上手套，並沾上一些母兔的尿，即可避免此弊端的發生。

(四)斷乳：幼兔離乳一至兩個月，在此換毛期內，體力消耗必多，本身抵抗力較弱，因此在管理上要特別小心。倘遇寒流侵襲，兔箱要施予人工保溫，以防凍死。在飼料方面，要注意清潔，以免引起疾病發生。同時應多給一些營養豐富且易於消化的飼料，以促進幼兔良好的發育，以加強幼兔的抵抗力。切忌給予有露水的青飼料，以免發生腹瀉(下痢)而死亡。(臺中縣大里鄉仁化村仁化路二一之一號林青萍)

洋菇發生塊菌病

應當迅速處理

由於氣候的不正常，常常會導致洋菇塊菌病的發生，使菇農損失甚大。本鎮往年受塊菌病之害面積曾達三百多坪，現在將其發生情形及處理方法介紹如下：

(一)塊菌病發生的主要環境：在高溫潮濕時較容易發生(溫度在攝氏二十三度以上，濕度在百分之八十五以上)。故在栽培洋菇時，應特別注意溫、濕度的調節。

(二)病徵：塊菌病初期極難發現，其徵狀，於中期時在洋菇床的底面，可見生長有與水菇(白皮病菌)極相似

的白色綿毛狀菌絲。但生長情形與水菇不同，它是集中生長菌絲，早乳白色。後期時在菇床上面培土上可以見到淡褐色的圓型病菌絲，然後再將發生菌絲處的培土去除，即可見塊菌病病斑。

病斑好像我們採收後的洋菇菇腳的菌絲頭，但其顏色略帶微淡黃色，如其病菌生長至培土外時就呈乳白色的病斑塊。

(三)為害情形：塊菌病蔓延迅速，如其環境適宜時，一天即可生長至三臺尺直徑的面積。而其病菌蔓延到的地方所有菇體全部停止生長，嚴重時甚至枯死。

(四)塊菌病發生時的處理，依我的經驗應該：

(1) 菇床發現有塊菌病時，立即將培土及床土和草全部去掉燒毀。去除的面積應比病斑大一倍以上，然後用石灰碳酸原液進行消毒，而後再用強鹼性石灰撒施於發病處。

(2) 如發生嚴重時，面積又大，可用煤油灑於發病處，所灑的面積也須比病斑大一倍以上，以免其病菌延伸他處。

(3) 處理病處人員，於工作完後，應立即行消毒，以免接觸他處，傳染病菌。


(4) 發病期應立即停止澆水、噴水，以降低洋菇室內濕度，防止蔓延速度的加速。

(5) 去除的病菌、培土、床土和草等，應須用火燒燬，以除病菌，避免蔓延。

(6) 應殺滅菇蠅、及其它害蟲，以減少傳染、蔓延為害。(桃園縣大溪鎮農會江政雄)

茄子少施磷肥

栽培茄子應注意澆水，不使土壤過於乾燥，否則結果少，落果多，果實長得慢，且不整齊，畸形果亦多。為使茄子結果多，品質好而色澤美觀，除注意澆水外，應不使斷肥，施肥時要注意重氮肥，鉀肥次之，磷肥除外，應少施用。磷肥施用過多時，會使果皮硬化，種子成熟度早，且會減損色澤的美觀。三要素的施用比例，應為氮三，鉀二，磷一。(後壁鄉嘉麥村一一八號邱玉書)



於苗播種後蓋上紗布棚，可防大雨沖失，發芽後或幼苗期可預防風雨災害。紗布棚視情形可以打開曬太陽。(彰化縣田中鎮和平里三十一號蕭櫻春)