

(2) 球面被破，球色白，品質佳。
(3) 播種後約七十一至七十五天可收穫，每畝重約一、五公畝。

(4) 最適播種期為九月至十月，在貴地二月間播種，收穫過遲，因生育後期常遇高溫，致結球常有不實現象。(李樹泉)

抱子甘藍不可摘心

可連續採收五十天

【問】：(1) 抱子甘藍定植後七十天，下部葉摘除多少？留多少？
(2) 是否要摘心？

(3) 植株離地面一寸高即開始結球，可否全部留下？
(4) 自開始採收，至採完需幾天？
(5) 定植後約七十天，可否繼續追肥？
(6) 苗栗縣大湖鄉義和村二十九號賴連安。

【答】：(1) 抱子甘藍開始結球後，葉部自然會下垂，而漸次黃變，可將下部黃變的葉，由下往上逐漸摘除，但上部葉切勿摘除。
(2) 不可摘心。
(3) 基部不結實的葉球，可早期摘除為宜，若結球充實堅硬者可留著。
(4) 通常自開始採收後，可連續採收約五十天。
(5) 因抱子甘藍的生育期間長，所以七十天後可繼續追肥。(李樹泉)

【十石】「三國」大豆
可青採當毛豆出售

【問】：(1) 雜糧作物園說內之「十石」大豆，是否菜市場所販賣之枝豆？北部栽培適合嗎？
(2) 貴刊十四卷十八期畫刊內的圖片，東部南瓜，本省北部採種栽培已經成功，未知何處可買到種子。
(3) 甘藍新品種「初秋」品質好嗎？其與「陽春」種比較如何？(臺北縣土城鄉寶儀村十七號廖年厚)

【答】：(1) 「十石」大豆適合北部春季栽培，作為黃豆亦可作為枝豆(毛豆)，北部市場之枝豆(毛豆)，多是「十石」或「三國」一種大豆，於未成熟之前採收供應市場者。
(2) 東京南瓜種子，可向臺北市迪化街二段八十六號「臺灣農產企業公司」洽購。
(3) 甘藍初秋品質良好，陽春較差，但不易腐爛。(王進生)

臺北雜交二號胡瓜

六十天可收苦果少

【問】：(1) 臺北雜交二號胡瓜須多少日數始能收穫？
(2) 追肥單用硫酸銨時，果肉會有何程度的影響？是否會有苦味？
(3) 本地有一品種名「烏龍種」(白刺)，收量特多，每條瓜果平均在三、五斤至六、七斤，但此品種非與種子行有熟的人，是買不到種子，請問其真名稱如何？(臺北縣貢寮鄉和美村和美街七號黃顯達)

【答】：(1) 臺北雜交二號，自播種至收穫約需六十天。
(2) 如施用高濃度之硫酸銨，容易引起苦味，但臺北雜交二號苦味果稀少。
(3) 貴地之烏龍種(白刺)，係頂雙溪之系統，普通均在二、三、五公畝左右。
(4) 臺北雜交二號胡瓜，適於春播(立春前後)。(王進生)

護保物植


PPP與多谷粒劑 對水田雜草效果好

【問】：(1) PPP粒劑與多谷粒劑對水田雜草效果如何？有無藥害？
(2) 防治柑桔潰瘍病之藥劑，推廣手冊中：有「好實粉」或加鏈黴素等，請問鏈黴素是何藥物？與「勃拉益斯」抗生藥是否相同？
(3) 柑桔紅蜘蛛用藥中有一種「魔立死」粉劑(推廣手冊介紹)何處有售？(嘉義縣番路鄉江西村柯長全)

【答】：(1) 柯長全農友所提問題茲簡復如左：
(2) PPP粒劑與「多谷」粒劑對水田雜草效果都很好，施藥後要繼續保持三分公積水十天，效果較好，「多谷」要繼續積水三十天。
(3) 防治柑桔潰瘍病之藥劑，推廣手冊中：有「好實粉」或加鏈黴素等，請問鏈黴素是何藥物？與「勃拉益斯」抗生藥是否相同？
(4) 柑桔紅蜘蛛用藥中有一種「魔立死」粉劑(推廣手冊介紹)何處有售？(嘉義縣番路鄉江西村柯長全)

【答】：(1) 柯長全農友所提問題茲簡復如左：
(2) PPP粒劑與「多谷」粒劑對水田雜草效果都很好，施藥後要繼續保持三分公積水十天，效果較好，「多谷」要繼續積水三十天。

世界名牌 原裝進口



英國

好利民 ALLMAN
動力噴霧機

L77型 西德 JLO 引擎
73c.c.3 馬力 重量15公斤



西德
愛速牌 AS 1-SL 型
動力噴霧機
73c.c.4 馬力 重量10公斤

特點：性能優越、堅固耐用、價格低廉

用途：噴霧、噴粉、噴粒、噴火、抽水

◀ 徵求經銷處 ▶
台灣獨家 奇特企業公司
總代理
臺北市仁愛路四段12巷8弄11號
電話：74637

日本製 進 口 豬弓蟲病的最新治療藥

克殺弓蟲 (クリサリン)

用質ヒラキシ研究出品・砒素劑及色素劑製劑

具有100%絕對效果 每瓶100元



家畜藥品總源



博濟貿易有限公司
博濟家畜大藥房

臺北市武昌街2段91巷1號 電話36148
郵政劃撥4616 李 戶

免費贈送「付二元郵票」博濟家畜藥品手冊「內容豐富
100頁各種疫病與各種新藥品之介紹」每人限一冊及康
福利手冊最新新聞各一份。

純正 三鷹辣椒籽

栽培獲利最多的外銷乾辣椒

敝公司由日本輸到原種純正三鷹辣椒種子歡迎照會

臺北市迪化街一段86號

臺灣農業資材公司