

穫前二星期，使菸苗恰好能够移植。
此外，在水稻插秧時，每株秧苗的間隔距離，也應該遵照一定的尺寸，最好能應用劃行器，先劃好插線，然後在交叉點處插秧。插秧的寬狹距離即可決定將來菸株的行株距離，其插秧的距離已如前述。

(一) 排水壓稻：移植前十日左右，將水稻田的積水排除，讓田土漸乾，準備整地移植。

移植前數日（即當水稻收穫前兩星期），將稻田每隔四畝，用竹竿或手分向兩邊壓伏成行，以便整地。

(二) 掘溝施肥雍土：在壓伏的水稻行間，將土壤犁鬆，再在各行的西側（保護菸苗使不受陽光照射），每隔兩橫水行處（就是計劃種菸處）施放基肥，然後將行間的鬆土掘起打碎，堆覆在基肥上成一個個的土丘，行間印成一條條約一·五—二·五英寸的淺溝，以利排水及灌溉。就可以準備移植。

(四) 秧苗移植，補苗。

(1) 移植：一般菸苗在播種後三五—四五日間，菸苗最大葉長十二公分左右即可移植。

為使移植順利，故菸草播種時期，應與水稻的收穫時期妥善的配合，其配合方式如前表，如提早

菸草植期，水稻播種期也應相對提前。

(2) 補苗：移植三—四日，即應進行補苗工作，且補苗工作要在移植後一星期內完成。

(三) 割稻：水稻成熟後應儘速收穫，以免延遲培土作業，影響菸苗因缺肥生育不良。

其割稻作業和普通收割一樣，唯需特別小心，以免傷及菸苗。

(四) 掘稻頭：割稻後即將稻頭掘起翻轉，排列堆積在菸株兩側，培土時將稻頭掩埋土中，腐解為肥料。

(五) 施肥作畦：水稻收穫後，田土比較乾燥堅實，不易操作，故須依照規定肥量施肥後，先用蜈蚣犁（或小型耕耘機）在菸株行的中間犁鬆土壤，再用開溝犁翻開土壤，分向兩邊，形成粗畦，最後用鋤頭打碎土塊，整理成畦，畦高視菸株發育情形而成。

(六) 中耕培土（大培土）

(七) 摘芯除芽

(八) 收穫乾燥

（菸草所有菸草間作幻燈片，如需複印可向該所接洽）。

地區	水		稻		菸草相應播種日期
	水稻品種	播種日期	收穫	日期	
臺中	臺中一八〇	七月五日—十日	收穫	十月廿二日—廿七日	十月八日—十三日
	臺中一八六			十月廿三日—廿八日	十月九日—十四日
	臺中特六號			十月十六日—廿一日	十月二日—七日
嘉義	嘉南八號			十一月五日—十日	十月廿一日—廿六日
	嘉農二四二			十月三十日—十一月五日	十月十六日—廿一日
	臺中一八六			十月廿三日—廿八日	十月九日—十四日

可馬林系安全殺鼠劑

強力殺鼠餌

強カ テイラット

使用簡便
人畜無害
藥房均售

優點 本劑對於老鼠具有特異強度的毒性，老鼠如果吃下此藥，必然眼球出血，為尋求光亮一定走出屋外而死，而且合乎衛生。

有令人難避欲滴的毒曲

如此豈有不中毒嗎？

臺灣總經銷：新瑞安行
台北市漢口街一段一三八號
電話：23804·34152

白式帝國製藥株式會社榮譽出品


