

「撒能」乳羊，飼養有利！

鄒金水

乳羊擠乳期中所需要的飼料，草類佔全飼料的三分之二（乾草量為準），濃厚飼料佔三分之一。例如一頭體重五十公斤，乳量一升（一〇〇公斤）的乳羊，每天所需要的飼料，以體重的百分之三計算，應為一〇五公斤，就是乾草一公斤（青草要四至五公斤），其餘五百公分給與濃厚飼料。

濃厚飼料的配合例豆餅二〇五%，麩皮四六%，米糠一六〇五%，鹽一〇五%，乾甘藷筴三三〇五%。又按體重四十五公斤計算一頭乳羊的飼料給與如下：

(1) 不產乳時餵給樹葉或青草四至五公斤。

(2) 產乳量二公斤時：上等青草（幼嫩牧草、樹葉、豆科牧草）六至七公斤左右，混合飼料二、三公斤左右（麩皮三七%，米糠八%，鹽一〇二%，乾甘藷筴四一%，大豆餅一〇五%，骨粉一〇五%）。

(3) 產乳四公斤左右時：上等青草四、五公斤，上好乾草九百公分（青草要四至五倍），配合飼料八百公分左右（麩糠類五五%，玉米二〇%，大豆餅二五%）。

疫病的防治

疫病防治應遵守「預防為先・治療為次」的原則。乳羊疫病應委請專

門獸醫去治療，而農友們應在飼養管理方面，多注意疫病的預防和飼養管理的改善，這樣就可以得到疫病預防的相當效果。茲將幾種常見的羊病介紹如下：

腰麻痺
原因：多在夏季蚊蟲為媒介傳染而引起的。

病狀：後肢腰角發生麻痺，站立不能橫臥，且呈興奮狀態。

預防：①消滅蚊蟲，羊舍保持乾燥清潔。

②勿與牛羊混養或在同一地區放牧。

治療：①即請較有經驗的獸醫治療。

②注射 Antimon 製劑 Neo-tinal 或 Spantonin。

胃腸炎
原因：發生原因至為複雜，如採食酸酵的變質飼料或不容易消化的粗硬飼料，或細菌之感染，或感冒受冷致病等。

病狀：反芻停止，食慾減退，下痢，消瘦等為主徵。

預防：①找出病原而預防之。②注意飼養管理的改善。

治療：投與健胃劑，如芒硝、次硝酸鈉、龍膽末、人工鹽、表飛鳴、木炭末等外另加些磺胺類藥投與一、二天即可見效。

鼓脹症

製配廠駐師技師日本

中日合資

註冊



商標

三笠牌 農藥



成分準確
藥效確實
(均有合格登記證)

驅滅稻飛蟲速效藥

得力寶水和劑 50%
得力寶粉劑 1.5%

防除稻螟蟲特效藥

BHC粉劑 1.5%
BHC粉劑 3%

蓬萊種水稻
稻熱病防治最好藥劑
稻熱病石灰 2.5 0.42%
美佳農錠 0.625%
紋新安穩生液劑 6.5%
展著劍 滲展素
純中性洗劑 三笠 F

台灣三笠化學工業股份有限公司
日本三笠化學工業株式會社 合資
彰化市大竹里大竹莊145號 電話2633號