

## 水源不足柑園 應行逐株灌水

**[問]**：(一) 在水源不足之柑桔園，而果樹又多時，要如何救急？  
(二) 本省果樹遮陰，及地面基部覆蓋，應採用何種方法。(新竹新增鎮下枋寮四十六號萬出)

**[答]**：(一) 相國如設於水源不充足地區，而果樹很多時，如要進行灌溉，最好依水量而定，先灌足第一株，後再灌第二株，下次有時，再接續灌第三株，依此類推，因此比較多株少灌有效。灌水溝離開樹幹以樹冠大為準：可耕施肥溝為灌水部位，有時亦藉畦間排水溝為灌水溝，普通依水量之多少，採滲過畦面或灌滿水溝辦法行灌溉。至於水溝深度因地勢及土質而異，普通探深寬各一至一臺尺。土深當然有切斷側根之嫌。惟柑桔每株需水量據前人研究需水約為九擔(普通農家挖肥用木桶)，本省柑桔需水試驗，正由新竹青青連銷合作社於新增試驗場舉辦中，詳情請預約並可去參觀。

(二) 果樹遮蔭以種植防風樹或間作物為有效。地面遮蔭可利用綠肥或稻草覆蓋。(王兆全)

**[問]**：請問文旦、椪柑、柳橙，那一種將來性較好？  
**[答]**：(一) 關於文旦、椪柑、柳橙之將來性如何問題，雖需考慮各品種之銷路情形，但也應視栽培地之土壤、氣候等因子而選擇適合於栽培地(生長旺盛，產量高，病蟲發生少，經濟壽命長)之品種種植。

茲將各品種之主要特性略述如下，以供參考：  
(一) 文旦優點：樹勢強健，產量高，熟期最早，具有品種獨特之味道；劣點：未有外銷之希望，生產過多，有降低價格之可能。

(2) 檳榔優點：品質優良，產量高，熟期尚早，價格高，有外銷，劣點：樹勢中等，不耐貯藏，黃龍病之罹病率高。

(3) 柳橙優點：樹勢強健，產量最高，熟低，僅適於東洋人嗜好。  
(二) 良好的鄧橙嫁接苗，須由樹勢旺盛，產量高，及隔年結果現象不嚴重之母樹採接穗，並嫁接於二年生酸桔砧木上，且其生長旺盛之苗木為最優良苗木。(翁仁祿)

**梨**  
——  
**樹梨**  
——  
**中生種產量最多**

**[問]**：(一) 横山梨早生、中生、晚生，三種之結果期與收穫期，各在何時？  
(二) 如何鑑別此三種果實？

(一) 此三種收量相差程度如何？(臺中縣東勢鎮粵樂里東蘭街十九號劉建志)

**[答]**：橫山梨之產量以中生種最高，其次為早生種，而以晚生種最少，至於其各特性略述如左表。(朱長志)

梨種類	秋花成熟期		春花成熟期
	橫山早生	五 月	八 月
橫山中生	五六六月	九 月	
橫山晚生	六 月	十 月	
果形	果皮色	果皮斑點	果重(平均)
扁圆	茶褐色	大、少	小、一八六
扁方	淡褐色	大、多	公克
扁圆	茶褐色	小、多	大、一二六
扁方	茶褐色	大、少	公克
扁圆	茶褐色	大、多	公克
扁方	茶褐色	大、少	公克

栽培獲利最多的外銷乾辣椒

## 純正二鷹辣籽

敝公司由日本輸到原種用純正三鷹辣椒種子歡迎照會

(春季種子價格表函索即寄)

臺北市迪化街一段86號

臺灣農業資料公司

## 農友們

同樣品種甘藍非常多，請不要再受欺騙了！

請認明

## 171初夏時一號甘藍

全年栽培，最耐熱，耐病，同様大之甘藍，重量超過三成以上。

高冷地栽培者注意，本品種移植65天收成，在圃場，可保留45天以上不破裂，堅硬如石頭，出口商保證看到此品種，高價收購。

## 興農交配

### 興農四〇日極早生花椰菜一兩

世界第一，研究成功，一代交配種(播種期四月一八月止)

結球白菜、甜椒、結球高莖、洋芹菜等各品種，詳細請參閱1968年春季園藝新知識(付郵2元即寄)

## 興農種子行

電話九七二六三三四

三重市重新路三段一〇八號

創發儲金四〇二八號

有限公司

封頂裡全頁

正文內頁全頁

正文第一頁全頁

正文內頁半頁

正文內頁三分之一頁

正文內頁八分之一頁

正文內頁全頁

正文內頁四分之一頁

正文內頁六分之一頁

正文內頁全頁

正文內頁三分之一頁

正文內頁八分之一頁

正文內頁全頁

正文內頁四分之一頁

正文內頁六分之一頁

正文內頁全頁

正文內頁三分之一頁

正文內頁八分之一頁

## 大梨的臺木 用有刺梨

**[問]**：(一) 據說大梨的臺木，用刺梨比鳥梨好，確實否？

(二) 刺梨是不是野生的一種？

(三) 何處有刺梨或苗出售？(后里鄉月眉村雲頭路一號林坤亮)