

水源不足柑園 應行逐株灌水

【問】：(一)在水源不足之柑桔園，而果樹又多時，要如何救急救衆灌水？實行間歇性灌水可否？

(二)本省果樹遮蔭，及地面基部覆蓋，應採用何種方法。(新竹新埔鎮下枋寮四十六號萬出)

【答】：(一)柑園如設於水源不充足地區，而果樹很多時，如要行灌溉，最好依水量而定，先灌足第一株，後再灌第二株，下次有水時，再接灌第三株，依此類推，因此比較多株少澆有效。灌水溝離樹幹以樹冠大小為準；可藉施肥溝為灌水部位。有時亦藉畦間排水溝為灌水溝，普通依水量之多少，探澆過畦而或澆滿水溝辦法行灌溉。至於水溝深度因地勢及土質而異，普通探深寬各一·五英尺。太深當然有切斷側根之嫌。惟柑桔每株需水量據前人研究需水約為九擔(普通農家擔肥用木桶)，本省柑桔需水試驗，正由新竹青果運銷合作社於新埔試驗場舉辦中，詳情請函詢並可去參觀。

(二)果樹遮蔭以種植防風樹或間作物為有效。地面遮蔭可利用綠肥或稻草覆蓋。(王兆全)

文旦、椪柑、柳橙 各有優劣宜地宜作

【問】：請問文旦、椪柑及柳橙，那一種將來性較好？

(二)柳橙的嫁接苗用那一種最好？(臺南關廟鄉內西村七十號鄭淑明)

【答】：(一)關於文旦、椪柑、柳橙之將來性如何問題，雖需考慮各品種之銷路情形，但也應視栽培地之土壤、氣候等因子而選擇適合於栽培地(生長旺盛，產量高，病蟲發生少，經濟壽命長)之品種種植。

茲將各品種之主要特性略述如下，以供參考：

①文旦優點：樹勢強健，產量高，熟期最早，具有品種獨特之味道；劣點：未有外銷之希望，生產過多，有降低價格之可能。

②椪柑優點：品質優良，產量高，熟期尚早，價格高，有外銷；劣點：樹勢中等，不耐貯藏，黃龍病之罹病率高。

③柳橙優點：樹勢強健，產量最高，熟期早，有少部份外銷；劣點：酸度與香味均低，僅適於東洋人嗜好。

(二)良好的柳橙嫁接苗，須由樹勢旺盛，產量高，及隔年結果現象不嚴重之母樹採接穗，並嫁接於二年生酸柑砧木上，且其生長旺盛之苗木為最優良苗木。(翁仁祿)

梨 樹

橫山梨特性不同 中生種產量最多

【問】：(一)橫山梨早生、中生、晚生，三種之結果期與收穫期，各在何時？

(二)如何鑑別此三種果實？

(三)此三種收量相差程度如何？(臺中縣東勢鎮粵寮里東崗街十九號劉建志)

【答】：橫山梨之產量以中生種最高，其次為早生種，而以晚生種最少，至於其各特性略述如左表。(宋長志)

梨 種類	秋花成熟期	春花成熟期
橫山早生	五月	八月
橫山中生	五、六月	九月
橫山晚生	六月	十月
果 形	果皮斑點果重(平均)	
扁圓	大、多	小、一八六公克
方圓	淡褐色	大、少
扁圓	茶褐色	大、二二六公克
扁圓	茶褐色	小、多
扁圓	茶褐色	大、二四一公克

大梨的臺木 用有利鳥梨

【問】：(一)據說大梨的臺木，用刺梨比鳥梨好，確實否？

(二)刺梨是不是野生梨的一種？

(三)何處有利刺梨或苗出售？(后里鄉月眉村雲頭路一號林坤亮)

【答】：(一)據說大梨的臺木，用刺梨比鳥梨好，確實否？

(二)刺梨是不是野生梨的一種？

(三)何處有利刺梨或苗出售？(后里鄉月眉村雲頭路一號林坤亮)

栽培獲利最多的外銷乾辣椒

純正 三鷹 辣椒籽

敝公司由日本輸到原種用純正三鷹辣椒種子歡迎照會

臺北市迪化街一段86號

臺灣農業資材公司

農友們

同樣品種甘藍非常多，請不要再受欺騙了

請認明

1毛儿初夏蒔一號甘藍

全年栽培，最耐熱，耐病，同樣大之甘藍，重量超過三成以上

1毛儿秋冬蒔甘藍

高冷地栽培者注意，本品種移植65天收成，在圃場，可保留45天以上不破裂，堅硬如石頭，出口商保證看到此品種，高價收購。

興農文配

興農四〇日極早生花椰菜一兩 一八〇元

世界第一，研究成功，一代交配種(播種期四月—八月止)

結球白菜、甜椒、結球萵苣、洋片菜等各種，詳細請參閱1968年春季園藝新知識(付郵2元即寄)

興農種子行

電話 九七二六三四
三重市重新路三段一〇八號 劃撥儲金四〇二八號
輸入元 林興農行股份有限公司

本刊

廣告

價目

封面全頁(二色) 四千九百元
封面裡全頁 四千四百元
封底裡全頁 四千元
正文第一頁全頁 三千八百元
正文內頁全頁 三千五百元
正文內頁半頁 一千九百元
正文內頁三分之一頁 一千四百元
正文內頁六分之一頁 一千零五十元
正文內頁八分之一頁 七百五十元
小廣告 每行十元，超過二十行部份每行二十元。