

【答】：(一)大梨的蠶木，用有刺小果鳥梨，比無刺鳥梨，在生長上比較有利。

(二)有刺小果鳥梨是一種野生梨，生長在新竹關西的山林裡，到關西可以買到苗或在晚秋買種子。

(三)如需要此項種子，可函新竹縣關西鎮南利里六四號彭登球先生。(宋長志)

木 林

泡桐分根繁殖最好 木材價高值得栽培

【問】：(一)請問梧桐樹是用分根繁殖或用種子播種？那一種好？種苗何處有售，價格多少？

(二)請問梧桐木材的價值如何？有何用途？有無銷路？大量種植是否可以？

(三)造林後何時開始可經濟砍伐？

(四)栽植、播種苗圃的氣溫管理各如何？請詳細說明。

(五)何時播種？何時種植最適宜？

(六)栽植在坡度較大的山地是否可以？其距離如何？

(七)病蟲害有那些？何時為害最烈？應如何防治？(桃園縣復興鄉義盛村九鄰廿號呂光明)

【答】：(一)泡桐(合名梧桐)繁殖方法有分根、播種、插條等三種，其中以分根繁殖法最佳。

中北部各縣政府都有經營泡桐苗圃，所養成泡桐根可免費推廣供民間造林，但其數量不多，不敷實際需要。至於民間方面，花蓮及南投縣有人銷售泡桐根，每根價格為〇.五至一元。如有需要，可寫信請該縣林務課介紹。

(二)泡桐木材為箱櫃傢具、保險箱隔板、音樂器材等之貴重原料，近年來外銷日本，供不應求，產地原木每才價四元以上，較杉木建築材料昂貴，故泡桐之經濟價值甚高，實值得擴大種植。

(三)泡桐生長極速，種植後八、九、十、十一月到經濟伐期，皆伐後尚可萌芽更新，其生長較新植更快。

(四)泡桐苗圃(分根繁殖)應設在海拔高三百至一千公尺間，且以排水良好之肥沃地為上選，造林地應在海拔一千三百公尺以下，東南面之山腹，土壤以排水良好而濕潤之沖積土為佳。

造林木之管理，最重要為種植後足一年時予以台切(即在地面處截斷主幹)，使萌芽以促進生長。又造林木之萌芽應隨時摘除，始能養成無枝通直之良材，其他管理方法與一般樹種同。

(五)泡桐苗圃之插根及林地栽植時期，以自立春至一個月後之間，即國曆二月上旬至三月上旬間最適宜。

(六)坡度較大之山地，如符合第(四)點內所述條件，可栽植泡桐。

泡桐栽植行間距離為三、三、三公尺，每公頃之栽植數一千株左右。

(七)泡桐分根苗圃之病害有瘤瘰癧病，但如選地適宜，則可避免發生，蟲害有夜盜蟲可在發芽時期注意驅除。泡桐造林木較無嚴重的病蟲害。(林文鎮)

洋 菇

改善覆土減少小菇 吹南風需調節溫度

【問】：(一)洋菇果實普遍密茂細小，是什么原因？如何處理果實才能長大？

(二)可否噴佈市面上所售的洋菇發育促進劑？噴綠藻水對洋菇的發育如何？

(三)遇南風時小菇容易枯死，是什么原因？有無防治方法？(苗栗縣苑裡鎮公館里六鄰七十三號邱劉娘妹)

【答】：(一)洋菇果實體密小，乃由洋菇性喜羣生或叢生，又加覆土土粒太細太薄，堆床太鬆，水分不易保持，故有細小的洋菇生出，如能將上述各種因素糾正，洋菇自然會長大。

(二)市面上出售的各種洋菇營養素，多數未經政府有關機構證明，或許可，最好不要使用。

(三)南風來時溫度高度濕度大，容易發生病蟲害，所以幼小洋菇很快死亡，防治方法須設法降低菇室溫度。(胡開仁)

中洲牌 小型輕便碎土除草機

用途：
菸草稻田內碎土(菸溝)及菜園碎土用，稻田、香蕉園、菜園、葡萄園、鳳梨園及各種果樹園除草用。

規格：
①身長3英尺②身高2英尺半③體重80磅④馬力：2-3-5馬力

性能：
碎土情形：深淺可任意調整最深6英寸，刀片可依情形調節，最寬1尺5寸最小4英寸

除草情形：
草連根同時除去，每小時約1分地。

■ 本機注意事項及操作 ■

①引擎及車身燃油不可缺少，應在使用前添加。
②操作速度如下：一速(硬土使用約每小時1分地)二速(軟土使用約每小時1分2厘地)三速(為走路用)
③碎土刀論停止及轉動可任意操作在本機右上方。



TPI281

好大▲本行為慶祝創立6週年，有贈送品並將T6型每臺5千元大優待請提早購買，勿失良機。

消優▲請注意：現時各牌子很多是不是實用還不知道，但是中洲牌有六年以上經驗本行保證實用。

息待，請認明中洲牌以免受騙。

中洲行： 臺中市復興路三段503號
(臺中酒廠新門對面)

最負責的品質



最老牌的農藥





正豐工廠

第一中興粉劑設備全自動圖為餘萬地