

水稻黑根黃萎病新藥
稻熱病

增收寶
健穢素 31

50公克裝
批價20元

是

溶水二仟至五仟
倍灌根噴葉均可

刷新原來的學理

強化內部
天然荷爾蒙的分泌組織

用自己陸續產生的完整
植物荷爾蒙使植物

開根、促進生長、健穢、
抗病、強花、養實、增收之功用

包括防止落果、水稻倒伏而乾枯、果實
及稻穀不豐滿，並可有抗寒、抗熱之性，無
論任何植物之一生均可常用，可混合任何農
藥使用。

各位農友！

這100年來化學肥料的普遍應用，植物雖然
生長迅速，但是內部植物荷爾蒙的分泌情形失調，
使植物體虛弱、容易患病、落花、落果、及出
穗後的水稻倒伏而乾枯，結實植物生命不長，果
實不豐滿，未達成熟程度即落果等百病滋生。

雖然這數年來使用人造植物荷爾蒙有補救一
些缺點，但是不能完全理想的發育，科學家們現
在已經發見某種稀有元素，能強化植物體內的植
物荷爾蒙分泌作用。

這就是健穢素的成份

天力化學工業股份有限公司

臺北縣中和鄉景平路47之2 電話 923111
郵政劃撥 5179 電報掛號 1199

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金）
5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便無論一包二包無任歡迎

火鷄蛋最好不要與鷄蛋同在一個孵卵器內孵化，
以避免鷄白痢、傷寒病和副傷寒等病互相傳染。
成績不良怎樣補救？
孵化完了打開孵卵器，當你看到很多火鷄雛卵
出當然很高興，但如孵出的是寥寥無幾時，就不免
傷心洩氣，而且不知所措。茲將孵化成績不良的原
因，和補救的方法列表如下，以供參考：

死亡胎 透明蛋； 早期；	很多無精 蛋	的孵化不良 的情況	可能的原因	補救方法
①種蛋貯存過久。 ②種蛋貯存期間溫度太冷。	①雄雞不夠或太多。 ②雄雞太大。	①調整雄雞和雌雞的比例；一隻雄雞對十隻雌雞。 ②把雄雞分成二組，輪流配種。	①種蛋貯存期間不要超過一星期。 ②種蛋貯存期間溫度要保持在華氏五十至六十度。	①調整雄雞和雌雞的比例；一隻雄雞對十隻雌雞。 ②把雄雞分成二組，輪流配種。

出殼過早	出殼但未	很多死胎	或太熱。 ③孵化期間溫度不規則。溫
①整個孵化期間溫度過高。	①濕度不足。	①翻蛋太早或太遲。 ②翻蛋不適當。 ③通風不適當。	③或太熱。 ③孵化期間溫度不規則。溫
①調整溫度。 ②調整濕度。 ③調整通風。	①增加濕度。 ②增加通風。 ③增加濕度。	①增加濕度。 ②增加通風。 ③增加濕度。	③或太熱。 ③孵化期間溫度不規則。溫

要耐心、細心，並經常不斷的經驗才能得到好的成績。
火鷄人工孵化工作不很困難，但也不容易，需

臍帶粗糙	二：雞 邊一 向或 外	慢，胚 但胎 啄正 收常 殼	出殼慢
①溫度過高。 ②發生盤太滑。	①溫度過高或翻蛋不當。 ②發生盤太滑。	①較後一週內溫度低過或電。 ②檢查溫度計，如不正常，可延長其孵化時間。	①溫度不足。 ②底層溫度低。 ③減少孵卵器內的通風。
①校正適當溫度。	①請看「很多死胎」的補救辦法。 ②蛋放置時鈍端要向上。	①當指示燈熄滅時，檢查溫度計，如不正常，可延長其孵化時間。	①調整適當溫度。 ②增加孵卵器內的溫度。