

葡萄種，要使樹勢穩定，剪枝應儘量採用輕剪定，此點在幼木時期尤須注意。在幼木時期不要考慮樹型和樹冠的擴大，一面生產，一面整理樹型，漸漸擴大最爲理想。尤其是在主枝的分岐點附近容易發生較強的枝梢，此種枝梢需要適宜整理，計劃四、五年收穫後剪掉。

施肥：葡萄的生育，依土性、土壤的肥瘠和耕土的深淺等而異，因此施肥量的決定較爲困難。尤以「巨峯」是生育很旺盛，結實不安定的品種，其施肥量多需依靠經驗來決定。

一般說來，只用化學肥料去調節樹勢是較爲困難的。爲安全計，應以堆肥或其他有機質肥料爲主體。如以化學肥料爲主體的話，基肥的氮素須要少施一點，等到着果後再以追肥的方式施用較爲妥當。

「巨峯」成木果園的施肥標準如表三。但如以無機質肥料爲主體時，需再施用堆肥。

結果調節：以一果枝留一果穗爲原則；細弱枝的果穗都應摘去。保留結果母枝時，應以每公頃產量一萬二千至一萬五千公斤做爲目標。如果留得過多，因爲結果過多，使結果母枝成熟不良，其後二、三年的產量都會受到影響。幼木時期的結果

調節，就是安定成木生產的基本條件。

表一：開花前摘心影響結果的情形

處理	第一果穗	第二果穗
只摘心	三四·四	一一五三二·七
生長點	三三·八	一〇九三六·三
葉摘心	三三·八	一一一
四葉摘心	三六·三	一二一
葉摘心	三六·三	一二一
無摘心	三〇·〇	一〇〇三二·八
無摘心	三〇·〇	一〇〇

表二：B 995 藥劑影響結果的情形

濃度	第一果穗	第二果穗
〇·五%	四二·五	一三四四五·五
〇·七五%	四六·四	一四六五一·四
一·〇%	四九·〇	一五四五四·四
無處理	三一·七	一〇〇三二·五

表三：巨峯葡萄的施肥標準

成分	肥沃土	地力中等	瘠薄的傾斜地
氮 (N)	七〇	九〇	一三〇
磷 (P ₂ O ₅)	五〇	七〇	九〇
鉀 (K ₂ O)	八〇	一〇〇	一五〇
鈣 (CaO)	三〇〇	三〇〇	三〇〇
苦土 (MgO)	一〇〇	一〇〇	一〇〇

禽畜養鰻用最新消化促進酵素

速美力素

SUMIRAZE

農畜衛可字第1713號
化驗字第1188號合格



- 可防止斷乳期幼豬消化不良。
- 節省飼料，促進生長，增加體重。
- 改良消化不良飼料，促進分解，增加飼料吸收率。
- 增加疾病抵抗力。
- 減少軟便及下痢。

本身含有豐富的維他命和家畜生育上不可缺少的成份，添加於飼料中，不但能促進飼料的消化吸收，而且可顯著改善其營養價值。

製造元 新日本化學工業株式會社

臺灣總代理



振芳工業原料有限公司

全省各大飼料行均有經銷

臺北市開封街一段——三號

TEL: 30200, 32358