

農友經驗



熟米糠治猪下痢

兩個月前我買了三頭仔猪，因為食慾太差（也許是環境與飼料不同之故），所以我就餵予豆餅湯（大豆餅浸生水），想提高其食慾，但却發生反作用，竟然下痢起來。

由於猪隻太小，所以不到二、三天，就瘦了好多，這時我就將生米糠放在鍋裏炒，炒到發出香味，稍等即可，然後分五次同飼料給食，每餐一次，每次一碗半，第一天吃過後即有起色，再一天便見痊癒，效果良好，因此提供給各位農友做參考。（臺中縣烏日鄉東園村七七號涂炎枝）

* * *

龍眼的嫁接法

很多人對於果樹嫁接法不很清楚，總覺得很困難，以致無法改良品種。尤其是對於龍眼樹的嫁接更感困難，有時往往接連做了三年還沒辦法做成，或以高價請人來嫁接，但成績也是不如理想。現在就將我的經驗和平日所看到所聽到的一些有關龍眼嫁接方法，簡述於後：

(一)在農曆十二月中旬，把所要嫁接的母樹在要嫁接處微上端鋸斷，使全部養分灌注在母樹上，以使母樹健旺。

(二)在農曆立春、雨水兩節的前後施行嫁接。

(三)選擇優良品種。

(四)嫁接時必需於母樹所吐的嫩葉中選下幾葉正由紅轉綠時，為嫁接的最好時期。所選擇的接穗如

也能選擇嫩葉的下幾葉正由紅轉綠時，如果兩者都能相符，則嫁接後的成活率是很高的。

(五)施行嫁接：

(1)必需把要嫁接的母樹其餘的枝芽去掉，在要嫁接處鋸平。用鋒利的嫁接刀，把鋸平處的皮與木質部去光。用嫁接刀從上而下直割一寸半許，潤約半寸，（依母樹與品種的大小任意處理）。把皮部與木質部小心分開，（容易分開的，成活率較高）並且把殘餘在木質部上的一些表皮去光。

(2)再取所選的接穗，（品種以枝條嫩紅亮的，樹葉大而黑的為好，大小約以小指大的較適用）用刀取一寸半許，處理好，把頭部約三分之二處，用刀削尖，注意必需削得很平滑，並且用刀去掉之處應保持清潔，注意不要用手去碰到，以使其和母樹質部能吻合。

(六)把做好的接穗插到母樹上，用繩子把它捆得很緊，使接穗和質部能全部吻合為佳。然後加上塑膠袋，再用繩子捆緊，不使空氣流通。然後再用香蕉葉或麻竹葉加在四週，遮住陽光。使不受太陽直射，且能保持水分，不使接穗曬乾，如此嫁接手續便告完成。

(七)在嫁接完成後必需十天巡視一次，不要使嫩芽由母樹生出，以消費養分。

(八)到四十天時，把塑膠布去掉，即可知道是否接活了。已經接活的，必需以竹片支撐着，以防被風吹折。（嘉義縣大林鎮中坑里馬蕉山三十號林文術）

* * *

公鷄去勢經驗

關於公鷄的去勢，我有下列幾點經驗：

(一)去勢的時間：去勢的時間，一般都在孵化後一至二個月左右，在這段期間睾丸易於剝別。如果過大則去勢後易流出多量血液，以致死亡。過小去勢時找尋睾丸困難。

(二)在去勢前半天左右不應給於飼料或飲水，以免腸內物、糞便充滿，去勢時應選擇晴天無風時為宜。

(三)鷄在去勢前必須有妥善的保定。通常助手先將鷄的翅膀及腳固定，以右手固定翅膀，左手固定腳。

(四)去勢用的器具通常用外科刀、張開器、去勢鉗及脫脂棉花。藥品通常用碘酒以及三三三的石炭酸。

(五)去勢的方法：

(1)先將去勢用的器具放入三三三的石炭酸稀釋液中消毒，以手將最後第一至二肋骨周圍部的羽毛拔除，然後塗上碘酒。

(2)用左手試探於最後第一至二肋骨間，大約背骨以下五至六公分處，用外科刀切開皮膚約四分之一八分之一的小口，以張開器徐徐張開傷口，再繼續割開約一寸大的切口。

(3)繼續用鉤將腹膜鉤破，即可發現淡黃色小粒的睾丸，以去勢鉗

輕夾住睾丸的基部，睾丸應在去勢鉗的中央，經多次扭轉後，慢慢拉出，勿觸破血管，然後以相同的方法取出另一側的睾丸。

(4)去勢完畢後取下開張器，後用手壓於術部，使外皮恢復舊態，然後再用碘酒消毒即可。

(5)去勢後的公鷄須要單獨飼養，放置稍暗而安靜的地方。給與易於消化營養豐富的食物，但不可過食。術後一至二日即可痊癒。但在這段期間應特別注意清潔，以免發病死亡。（虎尾鎮芳草里六號王烽銘）

* * *

如何採收搬運香蕉

(一)工具：機器三輪車、棉被四件、繩子。

(二)目的：節省包裝時間，增加搬運量，減少擦傷數，確保優良品質。

(三)方法：(1)將成熟的果穗割下。

(2)將果穗果段一段段割離。

(3)將棉被鋪在機器三輪車車床上。

(4)將果段整齊擺上一層，再蓋上第二層棉被照前法做，直到車滿為止。

(5)用繩子縛好運到集貨場驗收。

(6)所用的棉被可用舊的或不用的，不必全用新的。此法優點很多，各位蕉農不妨一試。（臺中縣霧峯鄉坑口村仁德巷四號莊湧冰）