

# 樹果

低溫不足花芽不分化

平地不能生產水蜜桃

**【問】：**(一) 桃枝末端，入冬枯死，有時枯死的枝，更會向下延長。(如附短枝標本是何原因？)

(二) 另有一些新枝，既無花芽，亦無葉芽(如標本)又何原因？如何防治？

(三) 請介紹一些臺灣目前出產水蜜桃的地點，和品種等實際情形？(陽明山下七股十二號鄉光電)

**【答】：**(一) 所寄來之枝條，係在幼枝時被食心蟲所侵害，可在花謝後用速滅松一千倍噴射，直到八月，每隔半月噴一次。無花芽之枝，似為徒長枝，下部無芽，上部僅具葉，如桃在肥土或多濕之地，遇發生之枝亦如此。

(二) 水蜜桃如冬天低溫不足，花芽不易形成，且在春天花芽葉芽多枯死。

(三) 目前臺灣出產水蜜桃，多在霧社及梨山，至少須海拔一千二百公尺地區，始能正常生產。

(四) 桃冬季在華氏四十五度以下低溫，需要至少八小時，如不够則生產不正常，此即臺灣平地不能生產水蜜桃之原因。有少數品種，如華仙水蜜桃、上海水蜜桃等，雖可



在冬季溫度較高地方生產，但品質差。(朱長志)

## 低溫妨礙鳳梨吸收

**【問】：**我在臺灣東部花蓮瑞穗鄉，北回歸線以南，海拔約三百公尺山坡地，種植鳳梨，請問在各季溫度攝氏十二度左右的情況下，施肥(尿素和硫酸鉀)於葉腋兩側，究竟鳳梨是否能完全吸收？並且需時多久方能完全吸收？(花蓮瑞穗舞鶴村一七六梁招春)

**【答】：**鳳梨是熱帶果樹，需要較高的溫度，才有良好的發育，大致言之，在攝氏二十度以下時，根部的生長不良，吸肥量受阻，若溫度再降至攝氏十五度以下時，對所施之肥料大多數無吸收，但實地雖然冬季氣溫常降至攝氏十二度，如白天氣溫升高時，所施肥料可能尚有緩慢被吸收之可能。(黃季春)

# 蔬菜

幾種蔬菜栽培的問題

**【問】：**(一) 冬至後栽培結球白菜應選何品種為宜？

(二) 立春前後可播的胡瓜(花瓜用)用何種品種為宜？

(三) 秋分前後，可否播種成功結球白菜？

(四) 胡瓜，結球白菜、敏豆、結頭菜、菜頭。每分地硫酸鋸、過磷酸石灰、氯化鉀，各施多少公斤？

(五) 上述菜類怎樣輪作？

(六) 尿素可否混合殺蟲劑大生粉等，同時噴射？

(七) 收成期敵豆潛蟲類怎樣用藥？


(八) 農曆十二月結球白菜收成後，種何菜可在清明節前收成？(臺中大雅鄉員林村神林路五號吳瑞彬)

**【答】：**(一) 冬至以後栽培結球白菜可選長岡交配一號及長岡交配耐病性六十日二品種。

(二) 立春前後種植花胡瓜，以余時，豐原

\*  
番  
馬鈴薯  
落花生  
香蕉  
大豆  
V  
葉斑病  
茄  
晚疫病

# 大生四十五 (DITHANE M-45)



農業登記證第722號 三磅紙袋原裝

現貨供應：興農化工股份有限公司

臺中縣大肚鄉中和村中山路10—6號  
電話：烏日局一〇六號

臺灣總代理：青象貿易有限公司

台北市漢口街壹段壹肆號柒壹壹室  
電話：三六一七七號

標商記登司公斯哈門羅城費州賓國美\*

大生四十五係現代最進步最有效之農作物用殺菌劑，其生物化性質與大生三十二及大生七十八或兩者之混和物都不相同，其防治各種病害效果奇佳如按規定使用絕無藥害，大生四十五已由植物保護審議會列入推廣於防治下列病害：

ROHM AND HAAS  
PHILADELPHIA

PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA

◎ 說明書函索即寄



鯉，成長效率較好），另外鯪魚、鮎魚或鱸魚也可酌放三百尾。

(2) 施放化學肥料養魚，當然以「完全肥料」最好（氮、尿素或硫酸銨，磷、過磷酸鈣，鈣，鉀、氯化鉀，也就是一般所說的三要素）。（談到經濟價值，最好僅使用過磷酸鈣，配合水肥最好，不但效果好，也很經濟。）

(3) 僅使用過磷酸鈣最好能附加水肥，每一甲池，如果池塘的底質並不太差的話，三百公斤就可以。

(4) 從四月旬開始至九月下旬，每旬投放一次，最好在上午九時後施放，切忌陰天或雨天施放，晴天的施放效果最理想，施肥後池水不要排出。

每一甲水池，如能按照規定的施肥量，收效量可達二千一千四百公斤。

(5) 全臺無稽之談，最近數年來，自從臺灣人工繁殖成功後，所需的鰱、大頭與草魚均無進口，皆由自己繁殖供應，根據實地經驗，鮑魚養殖一年，超過二公斤者甚多，魚苗商所說各節當有其他用意。

(6) 注意水質的變化，餌與肥料的按時投放，防逃與防盜等。

(7) 因池塘本身養料已很多，不須投放肥料，但放養量不能過多。

(8) 該項養飼料，本人試用之近二年，每公斤約十六·五〇元，目前在其很多問題，仍未解決改良前，不便詳細奉告，因為臺灣迄目前止，還沒有一種合理理想的養飼料。(安可倫)

### 魚池施肥四至九月

晴天九時得施效最好

【問】：(1)我經營一甲二分地池塘養有

鯉魚、鯪魚、草魚等，過去施用過猪屎、豆粕等，發育不如理想，到年末鯉魚只有一臺斤左右，請指導施用過磷酸鈣方法、數量？

(2) 幾日施用一次，何月起施用至何月終止？

(3) 草魚施用青草等以外，用金錢可以買

到的尚有什麼飼料？(彰化埔鹽鄉打鹿村堵打路三九號施有孝)

【答】：(1) 池塘施用化肥的數量並無一定標準，是以其本身生產力的優劣作決定。

如生產力高的池塘，只要施放很少的化肥就可以達到理想的程度，假若數量太多，不但浪費，而且並不會收到預期的效果，較差的

池塘每年施用過磷酸鈣三百五十公斤（或最好配合水肥效果較佳），就能有很好的效果

(2) 最好每十天施放一次，自四月中旬開始至九月下旬止（假如南部如高雄、屏東一帶因氣候較暖，可酌予提前或延後）施放時最好選擇晴天，在上午九時之後較佳。

(3) 一般草魚的飼料，多以鮮嫩之青草為主，其次大豆餅對草魚也很有效果，但是施肥之後，草魚的成長可能會較為理想，(安可倫)

### 林造

【問】：(1) 現濕地松苗是否有

配發，申請手續如何？如無何處有售，每株價格多少？

(2) 每甲當以種植多少株為適當？

(3) 種植後多少年可砍伐？松樹可做何用

途？每甲純收益多少？(楊梅鎮瑞原量九十

四號古瑞昌)

【答】：(1) 濕地松苗木，北部各縣政府都有蒼苗免費分配公私有林造林之用，請直

接向當地鄉鎮公所或縣府林務課申請。目前

民間無濕地松苗木出售。

(2) 每甲林地種植三千五百至四千株為宜。

### 美國鳶尾大葉洋蔥

備有各種蔬菜及花草種子價目表及以上三品種之說明書函索即寄。若附郵資一元即寄以上三品種以供試種。

農友百貨店 || 豐田種子農藥行  
◎ 優良蔬菜種子新品種簡介  
文配夏早生甘藍  
一代交配秋寶甘藍  
一代交配長形極早生南瓜  
一代交配長形極早生甘藍  
耐寒耐雨抗黑腐病極強，收期早，移植後55天可收穫，每球重達三兩以上，結球整一球型美觀，質脆味甜，為夏季雨季栽培最可靠有利之王，甘藍。

耐濕性及抗病性極強，發育快，球形扁圓，葉脆鮮白，柔軟質甜，可與長岡交配，初秋甘藍比美。

播種後40日可收穫，每果長一尺左右，重約0.5公克，每棵可收六十七果，立性不倒，藤約可密植，易栽培，產量極高，食味尤佳。

### 最老牌的農藥



成長中的正豐農藥 圖為與世界農化總公司 PHILIPS-DUPHAR 合作，佔地廣達萬餘坪的正豐二廠全自動設備粉粒劑部門興建中一瞥

其他優良結球白菜、トマト、  
代交配西瓜、甜椒、洋蔥、蘆筍  
應有盡有，歡迎照會其  
他任何品種。

臺灣總代理：三正貿易有限公司  
地址：高雄市新興區中山一路61號  
電話：二五四五  
郵政劃撥帳號：高市四二六一〇號邱榮和收

