

！病葉簇生花：意注

• 田 益 黃 •

，種子細小，不發芽。

省花生常見的
一種病害，因
為病植株多
半不結實，所
以，一般農友
都稱它為「豆
公」。這種病
害，近年有逐
漸普遍猖獗的
趨勢。

筆者所知，提出有關這一病
害的一些知識，以供農友們
參考。

由於它的
寄主植物種類
繁多，媒介昆
蟲食性很雜，
同時本省近年
氣候適合它的
發生，本文就

根據田間調查：本省以往栽培的
花生和一些新品種，大都會感染簇葉
病。一般確病率在三%至四%之間。
罹病品種有：臺農一號、臺農三號、
農育六一〇一、南改系五八號、南改
系五九號、南改系六〇號、農育B一
五六六，和農育M H一一一三七等。

後，即能繼續傳播病害，直到死亡為

止。南班浮塵子一經攜帶病原

時則延長。南班浮塵子一期約二週，幼蟲

期約三週。成蟲則可生存一至三個月

之久。一般以幼蟲型態越冬。

根據田間調查：本省以往栽培的

花生和一些新品種，大都會感染簇葉

病。一般確病率在三%至四%之間。

罹病品種有：臺農一號、臺農三號、

農育六一〇一、南改系五八號、南改

系五九號、南改系六〇號、農育B一

五六六，和農育M H一一一三七等。

柑桔！梨子！果樹！救星！

黑星病！瘡痂病！

特效藥！



美寶粉
MILTOX



裕企台股業有限公司
地址：彰化市十五里和平路四四〇三號
總公司：台北市北陽街四十六號

現貨總供應處

新竹三信農藥行

電話：三〇三一・三〇六一
新竹市中央路84號

- 可與一般殺蟲劑混合使用
- 不生藥害
- 無毒無臭
- 用法簡單



註冊

病株莖、枝、柄上的茸毛，比正常株稀少。花瓣褪色綠化，形如小葉。花柄不能伸長入土，因此，失去稔實性，縱使結實

罹病植株呈萎縮、枝葉叢生的症狀，分枝多而細弱，主分枝外再岐生分枝，而上端始着生小葉，小葉有些僅三毫米大小。有些分枝上，自葉基再生短而纖細的分枝，達十數枝之多，而不着生羽狀複葉。

病徵



微病病葉簇生花：一圖

裕企台股業有限公司
裝原裝分口進



農耕機巧妙利用 翻犁田角不費力

*

英譯 *

免成爲傳染病源 *

農作時農友們請試一試。又很省時間，操作時非常省人力。這個人方法設備很簡單，操

臺灣肥料公司的農業技術人員，最近想出一個辦法：就是在農耕機的後面帶着一個木柄犁，用雙股麻繩（長約一公尺，直徑約〇·八公分）一端繫於農耕機上的掛鉤，另一端繫於犁的先端掛鉤（請參看照片），當我們要翻犁靠近田埂或田角近處的土壤時，只要把木柄犁用麻繩掛在農耕機的後面，另加一人持犁隨着農耕機前進，便能隨心所欲的全翻犁。當田埂邊緣和田角近處翻犁完畢後，就可把木柄犁去掉，讓農耕機繼續進行翻犁工作。

使用農耕機翻犁田土，尤其是小區試驗田，往往因農耕機體積過大，靠田埂邊緣和田角近處無法犁着，在過去我們只好再用鋤頭來翻土，這樣非常麻煩，也很費時費力。

族葉病的寄主範圍非常廣泛。它不但侵犯豆科作物，其他如菊科、十字花科、草科、藜科等植物也會遭受侵襲。豆科作物中，除花生外，如大豆、豌豆和綠豆等，都是它的寄主。本省田野常見的山葵豆屬植物蠅豆草（雨蝶翅仔），也是它的寄主之一。



蟲成予塵津班南：二圖

蟲劑驅除南斑浮塵子。花生園附近的雜草，也應同時施藥，澈底防治。

(2) 應隨時拔除病株燒燬，避

大成農藥



品質可靠

價格公道

巴拉松	47%乳劑	登記証 835號
速必靈	19.5%乳劑	登記証 836號
新福農收	50%乳劑	登記証 837號
多快大	46.6%乳劑	登記証 893號
福農力	40%乳劑	登記証 914號
稻威得	50%乳劑	登記証 948號
	24%乳劑	登記証 951號
	5%乳劑	登記証 1009號
	25%乳劑	登記証 1010號
	5%乳劑	登記証 1022號
	50%乳劑	登記証 1023號
	20%乳劑	登記証 1025號

大滅靈	25%乳劑	登記証 1337號
大殺蟲	10%乳劑	登記証 1042號
一利新	6.5%液劑	登記証 1044號
可利新	25%乳劑	登記証 1103號
大大利	50%乳劑	登記証 1105號
大大必	70%乳劑	登記証 1110號
地安	50%乳劑	登記証 1128號
安殺蟲	50%乳劑	登記証 1136號
特靈王	4%乳劑	登記証 1142號
農特靈	18.5%乳劑	登記証 1149號
地安	15%乳劑	登記証 1163號

大成化學工業股份有限公司

臺中縣外埔鄉三崁村二崁路一六號