

# ！病葉簇生花：意注

• 田 益 黃 •

簇葉病(叢葉病)是本省花生常見的病害，因一種病害，因為罹病植株多半不結實，所以，一般農友都稱它為「豆腐公」。這種病害，近年有逐漸普遍猖獗的趨勢。

由於它的寄主植物種類繁多，媒介昆蟲食性很雜，同時本省近年氣候適合它的發生，本文就

，種子細小，不發芽。

## 傳 染

南斑浮塵子(如圖二)是花生簇葉病的媒介昆蟲。病原在這昆蟲體內的潛伏期約為一個月，但仍因氣溫而異。夏季氣溫高，潛伏期縮短；低溫時則延長。南斑浮塵子一經攜帶病原後，即能繼續傳播病害，直到死亡為止。南斑浮塵子的卵期約二週，幼蟲期約三週。成蟲則可生存一至二個月之久。一般以幼蟲型態越冬。

根據田間調查：本省以往栽培的花生和一些新品種，大都曾感染簇葉病。一般罹病率在百分之四至百分之十之間。罹病品種有：臺農一號、臺農三號、農育六一〇一、南改系五八號、南改系五九號、南改系六〇號、農育B一五七六，和農育MH一—一三七等。


## 病 徵

罹病植株呈萎縮、枝葉叢生的症狀，分枝多而細弱，主分枝外再岐生分枝，而上端始着生四小葉，小葉有些僅三毫米大小。

有些分枝上，自葉基再生短而纖細的分枝，達十數枝之多，而不着生羽狀複葉。

病株莖、枝、柄上的茸毛，比正常株稀少。花瓣綠色綠化，形如小葉。

花柄不能伸長入土，因此，失去稔實性，縱使結實



微病病葉簇生花：一圖

柑桔！梨子！果樹！救星！

黑星病！瘡痂病！

特效藥！



裕台進口 原分裝

現貨總供應處

新竹三信農藥行

新竹市中央路84號  
電話：三〇三一·三〇六一

- 用法簡單
- 無毒無臭
- 不生藥害
- 可與一般殺蟲劑混合使用

牌 卦 八

商標



註冊

裕台企業股份有限公司農化工業廠  
地址：彰化市和平里十五號·電話：三〇四四  
總公司：台北市衡陽路六十四號