

鰻魚飼餵工人餌料 必須定時耐心誘導

郭河

利用田間排水溝養鰻雖無不可，但要施設防鰻魚逃逸，需相當工夫。

飼育鰻魚，如採用下雜魚為餌料，給以生餌料，必需以絞肉器先予絞碎，而以煮餌料給與，就不必絞碎。鰻魚習性，在天然間概以夜間活動索食，其對魚多為天然之小型動物，放養後當然一時不慣索食人工給與的餌料，所以為使其短期內能習慣索食人工餌料，必需按其習性。

當初最好能够以類近天然食物，如絲蚯蚓、牝蝸肉或其他魚類肉等給與，再不然就用較新鮮之魚肉絞成魚醬，於黃昏後選一固定給餌場所，裝於適當之給餌籠內，放沉到池底，予以誘食但起初仍不立即開始來索餌，每日仍需以新鮮餌料同樣時間及要領將其換餌一次，幾天內當可使鰻魚察覺而漸習慣於索食。

索餌，在此後應視其索食情形，逐漸將給餌時間拖延到上午白天給與，同時可將其主要餌料漸予代替，而將給餌籠逐漸往上吊至水面，當能正常的給餌飼育。

此項誘餌工作，是養鰻飼育管理之第一主要關鍵，如誘餌無法上軌道，立即影響到以後之養殖成績。但為促進其誘食早日上軌，尚可將給餌場稍加予遮暗，並於夜間點燈，同時加注少量水，比較容易將鰻魚誘集於給餌場。

用網是在中間捕獲或清池時使用，網之形狀如大型之長方形較帳，以尼龍無結節網，或以尼龍抱雙腳編結（蛙叉）結編而成，下緣附嵌附沉鉛子，上緣附有浮膠筒，兩邊即張結有適宜之竹桿，待鰻魚拖攏集索餌時，由兩人下池各執一端竹杆，迅予揮向給餌料場，將所蟬集之鰻魚拖攏網中提起選出漁獲物處理。

鰻苗在各地沿海均有出產，茲將各地主要業者介紹以供參考：

宜蘭縣壯圍鄉鹿後路三十號（李真助），臺北縣五股鄉獅仔頭十六號（林海子），臺北縣士林鎮葫蘆里三三號（郭卿），臺北縣士林鎮倫等里四八〇號（楊石城），彰化縣和美鎮大霞里彰和四巷五七號（王水景），彰化縣鹿港鎮中山路（郭樹榮），嘉義縣朴子鎮南通路六三號（王新扶），嘉義縣六脚鄉十四林八十號（吳儀）。（臺南縣後壁鄉楊瑞章農友來信詢問養鰻問題，請參看本文）

低毒性殺蟲劑 加保利 (Carbaryl)



維多 A

(登記九八二)

防治：蔬菜露菌病、蕃茄及馬鈴薯晚疫病、慈菇赤銹病、大豆銹病

Sariaf S.p.A. FAENZA


意大利 沙利富化工廠 出品



防治：水稻浮腫子、飛虱、柑桔蔬菜殺蟲劑

因克靈 50

(登記七六九)



因克命 80

(登記九三七)

品質可靠之猛乃滿 (MANEBB)

防治：香蕉葉斑病、慈菇赤銹病

INCHEM

丹麥 化工農藥廠 出品

和豐	乳劑	46.6%	登記(1070)
豐谷	乳劑	50%	(1071)
松谷	乳劑	50%	(1053)
安谷	乳劑	40%	(1052)
治蟲	乳劑	50%	(1054)
蟲必	乳劑	6.5%	(1018)
滅枯	乳劑	25%	(1256)
滅蟲	乳劑	10%	(1270)
殺蟲	乳劑		

和豐牌速敏	粉劑	1.5%	登記(1280)
和豐牌BHC	粉劑	1%	(1288)
和豐牌BHC	粉劑	3%	(1355)
尼古丁	液劑	4%	(1302)



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路五號 電話：3518(彰化市)