

幾種常見的 種雞疾病防治法

好農家廣播稿

(一) 雞的軟脚症：

(1) 飼料中無機物質的缺乏與過剩引起的：如鈣與磷的配合不妥過多或過少。日常應注意飼料中鈣與磷的比率，最好以一：〇・六——〇・〇爲宜。

(2) 缺乏維生素：與軟腳有密切關係的維生素有 D、B₂ 兩種。如缺乏 B₂ 小雞會發生腳趾彎曲，缺少維生素 D 也會引起軟腳。如補給維生素就可恢復或減少，方法有注射 10mg I₂。維生素 B₂。每日每隻成雞三公克，中雞一二公克，小雞〇·五——一公克或飼料中添加魚肝油三——五% 維生素 A 加 B 加 D₃ 劑每一百公斤十八——二十四公分。

(3) 缺乏錳：平常飼料中，產蛋鵝需要〇・〇二%、肉鵝〇・〇五—〇・〇六%的硫酸錳的混合，可防止軟腳及提高受精率。

(4) 麻痺性軟脚：

如患新城雞瘟、神經性白血病、白冠病等均會發生軟脚，因神經麻痺致發生腳麻痺或有一腿伸前一腿伸後的情形，此症無特效藥可醫。

(5) 飼養管理欠佳所引起的：
籠飼式應注意收容隻數，不宜過擠，不要讓鷄驚怕撞傷引起外傷，致由葡萄狀的感染引起胸腳部腫脹。

(二) 球蟲病：
本病係由球蟲的腸內寄生而發生

，普遍發生在 high 濕季節，冬季少發。稚雞在三週齡前後發生最多，均屬盲腸型（急性），被害甚大。八週齡以後至十二週齡發生者多屬慢性小腸型。防治法應注意育雛器（舍）及器具，曾被本病污染者，應嚴格施行消毒（高溫消毒）後使用。防治藥品

①十二・五
蘇爾美
液
五每週一
二天飲水代
二一三
天

② DDT 可能發生季節時自育雛

③磺胺劑
開始至十二週齡間飼料中
添加十萬分之二・五
飼料中加入〇・五%磺
胺劑


(三) 新城雞瘟

係由濾過性病毒感染所引起的，潛伏期約有三—五天，傳染力強，死亡率高，本省各地四季都會發生。此病疫苗有活毒、死毒疫苗兩種，活毒疫苗有點昂用、注射用、飲水用等三種。因活毒疫苗效果較好，但其使用條件特殊死毒疫苗均屬肌肉注射用疫苗，使用方便，普通注射量為一個月以內每隻〇·三西西，一個月以上至二個月每隻〇·五西西，二個月以上每隻一·〇〇西西，每四個月注射一次，即可保持免疫。（省農業廣播中心提供）

TM-15R
噴霧灑水兩用

- ①附三菱牌單相馬達一馬力及附屬品。
②或附飛鳥牌6馬力汽油引擎及附屬品。
- 重 量：**17kg **送水量：**噴霧每分29公升 灌水每分53公升
- 優 點：**①24小時繼續使用不損機件。
②抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
③用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
④本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。

(另有TM-5R噴霧專用，TM-45R噴霧灌水大型共同防治用，請洽購)



幫浦效率最高

日本 東海牌動力噴粉、噴霧兼用機

(ミストダスター108型)

特點：獨創兩次攪拌空氣加壓方式之強力噴霧構造，優於任何類似機器之性能。

優點：

- ①輕便 (9.5kg)；可噴粉、噴粒、噴霧、噴火。
- ②混合、噴撒微粒均極均勻。
- ③水田、果蕉園、蔬菜園、山坡丘陵皆可運用自如。
- ④省油、實用、價格特廉。

另有東海刈拂機（稻、麥、草均適用）及電動草刈機接受訂貨進口。

總經銷：新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號 電話：34190



每部附有30公尺噴粉帶一條

誠徵各地經銷商