



蔬菜

洋蔥每分地種子八臺兩

需要多少種子？
 (問)：() 蔥每分地，每分地
 () 種子何處有配售？(南投縣埔里鎮)？
 () 何種地較適合栽種？(臺中縣和平鄉
 上谷關連見工程處徐曉慶)

【答】：() 洋蔥每分地所需種子量，以
 栽種疏密而不同，普通十公畝(每分地)需
 二二五公克(六台兩)至三〇〇公克(八台
 兩)。
 () 農會會員(被農)可先向鄉鎮農會申
 請，購買手續，由省農會統一配售種子，每
 會員限於申請二公畝以下，〇·二公畝以上
 但埔里鎮未列為產銷計劃實施地區之內。
 () 土質以多含有機質，疏鬆軟肥沃而
 有相當保水力且靠海邊或有通風之砂質壤土
 或壤土為最理想。(會經均)

毛豆在英色轉黃前採收

每分地產一千五百公斤

【問】：據說本省採大豆青莢，即毛豆
 的消費市場，食品加工廠等的吞吐量頗大，
 如從事生產，應採用何品種？何時播種？何
 時可收青莢？產量約多少？種子何處有售？
 根瘤菌接種可增收多少？何處有供應？收購
 青莢的地方在何處？(虎尾北溪厝十六號許
 亞慶)

【答】：毛豆品種可採用「青早生」、「
 「十石」及「和歌鳥」等三種。播種時期
 依品種而不同，青早生及十石適於二月中旬
 至十月隨時均可播種，和歌鳥北部適於六月
 中旬至十月中旬播種，南部適於七月中旬至
 十月中旬播種。

毛豆適收時的特徵，是一株上大部份豆
 莢已充實肥大，但莢色尚未轉黃色以前。即
 青早生及十石播種後六十到七十天收穫，和
 歌鳥播種後九十到一百天收穫。每十公畝產
 量約一千二百到一千五百公斤。

是項種子可向高雄區農業改良場接洽。
 毛豆有根瘤菌，能固定空氣中的游離氮
 素，故無須根瘤菌接種。但亦需施用氮、
 磷、鉀三要素，才能增加產量，就肥料效果
 來說，速效性氮肥在大豆生長期，即花步
 分化形成前施用，對於單位面積產量影響頗
 大。

收購青莢(毛豆)的工廠，可向附近食
 品冷凍工廠接洽。(李樹榮)

洋菇子實體如何加大

【問】：() 洋菇子實體，結實
 小工廠採收，如欲改正寄生狀態為
 大形應怎樣處理？
 () 堆積場所最好用何種藥劑來消毒？
 () 菇床上白色及綠色菌絲的發生原因是
 什麼？如何預防？
 () 菌最下層，菇床發熱後半期收量減少，
 應如何補救？
 () 何種肥料在醱酵期間，上面要不要覆蓋？
 () 預防腦菌病發生使用福馬林，必速滅
 滅，何種藥劑可殺？(臺中大雅鄉員林村神林
 路五號吳瑞彬)

【答】：() 子實體小，受品種之影響很
 大，但在同一品種中欲加大子實體之肥健，
 請利用以下之方法：
 1. 噴水用〇·二%之碳酸鈣液代替之。
 2. 在原本的覆土上，加蓋一層清潔之土
 3. 調整為七·五到八之間，此種調整請使
 用消石灰。
 () 堆積場所最好用福馬林農乳劑之一千倍
 液消毒，為便通風良好應用竹仔墊起。
 () 菇床上之白色及綠色菌絲或孢子，均

世界著名

滅 蚜 蟲



特 効 藥

「賽福施」'SAYFOS'70

信用可靠

台灣省農林廳農藥登記證第309號

「賽福施」70('Sayfos'70) 是英國植物保護公司研究發現的殺蚜蟲
 特效藥其有效成份「滅蚜蟲」(Memazon)對蚜蟲毒性最大。

- ①藥力特別強：浸透循環性特強，可達作物內部各組織及生長點而
 保護新葉；甚至於葉背上沒噴到藥劑的蚜蟲也照樣被驅除。因此可殺
 死全部蚜蟲。
- ②藥効特別持久：可保護作物達六星期之久；留在葉上水份蒸發後的
 藥劑，經雨、露潤濕後仍可繼續浸透，發揮連續保護作用。
- ③對作物特別安全：使用過量也絕無藥害；對幼芽更毫無損傷；從發芽
 開始到收穫直前，都可安心噴酒使用。
- ④完全無惡臭：不刺激鼻眼；人人樂於
 噴酒；收穫的作物上也不殘留藥味。
- ⑤對人畜無害：對人、畜絕對安全無害
 ；無論何時、何地、何人請放心噴酒。
- ⑥可混合使用：與其他任何農藥混合使
 用，絕不失去藥效。

作物	稀釋倍數	藥效期間
柑橘、桃、梅、梨等果樹類及菸草	四 仟 倍	六 星 期
蔬菜(瓜、豆)類： 蘿蔔、黃瓜、蕃茄、花生 茄子、甘藍、玉米、蠶豆、綠豆 棉花、捲心菜、馬鈴薯 十字花科菜類等	4,000倍	

4公克加16公升(公斤)水得4,000倍濃度水溶液，可裝一桶噴霧器使用
 50公克包裝，每份加200公升(公斤)水得4,000倍濃度水溶液。

「使用法」



◎加用展着劑愛
 展或愛滑力効
 果更佳。

英國植物保護公司榮譽出品
 臺灣總經理：經華貿易股份有限公司
 台北市長安東路一段17巷10號 TEL: 558680