

爲空氣傳染者爲多，使用大生二十二之五倍液防治（預防）水傷時大部份之外表寄生菌，均可同時收效。

（四）下層床之收量減少，大部份均受二氯化碳氣窒息現象之結果，因二氯化碳之比重於空氣，故下層受害最大可利用冬季家庭用之電風扇休閑的時間，借用於宿舍作送風器的代用品，將二氯化碳吹出舍外即可恢復。

（五）堆肥醱酵期間無論是側面上面均不必蓋，以求通氣之良好，到醱酵完成到上床前之一到二天可以全面包起來使其透過熱膠布吸收太陽熱能可達後醱酵之效果。

（六）使用必速滅福麥林好。（杜白蠟）

料飼

那些品種？
【問】：（目前樹薯（薯）有樹薯作飼料應先浸煮）

（一）種植的時期、株行距及如何種植，適於何種土壤、酸鹼度？

（二）每公頃的產量若干？肥料用量比率如何？

（三）其他中耕、除草、施肥之時期，病蟲害等及栽培管理上應注意些什麼？

（四）作爲飼料時應如何處理始免中毒？（北市賓陽街二段二十九巷十八號李信男）

【答】：（一）目前樹薯的品種可依其塊根肉皮色澤而分類，即有「白色種」及「紅色種」二類。臺灣從南洋各地引入品種，多爲肉皮白色的品種。本省優良木薯品種有爪哇四號 S.P.P. 3839 S.P.P. 8625 S.P.P. 2530 S.P.P. 3006 等品種。

（二）木薯繁殖一般不用種子，而用扦插法。二到四月爲種植適期，插穗用中，下部位的葉，長十五公分左右，垂直插爲佳露出地面二到三分，行距一百公分，株距七十五公分，土壤適應範圍很廣，但以表土深厚的壤土或砂壤土略宜。

（三）每公頃塊根收量約二萬—三萬公斤，可得澱粉四千到六千公斤。新墾地可不施肥，但不宜連作。爲保持地力，每公頃應施堆肥一萬公斤，草木灰三百五十公斤追肥人糞尿三千六百公斤。

（四）施肥，在株高一到一·五公尺時，

施前除草中耕施肥後填土。生育期中如爲最風雨吹倒，應即行扶起填土，使其迅速恢復生長勢。

病害木薯葉有時發生斑點病，要摘除被害後葉，勿使蔓延。蟲害有介殼蟲和紅蜘蛛爲害葉部，可撒佈石油乳劑等防治之。

（五）木薯的根、莖、葉、各部份都含一種氰酸毒質，如此毒質未除去，多食會中毒，輕則昏迷，重則致死，這種氰酸所溶於水，加熱後可消失，新鮮塊根加水浸小時可煮熟後即無毒，可供飼料。（總進三）

病猪

飼養管理不好
仔猪易患濕疹

【問】：（一）我飼養菜頭仔猪，因氣候陰寒，故舍內加入乾稻草，經十日，猪羣身體上彷彿發皮膚病，毛脫掉，皮膚粗糙，於腋下及鼠蹊部呈有紫褐色，食慾不振，體軀瘦弱，後以半猪安洗身體三次未見有效，這是何病？如何治療？

（二）有些猪隻又患咳嗽（乾咳），二星期後，呈腹式呼吸，消瘦而死是何原因？

（三）我的飼料是木薯粉與大豆餅粉配合的，是否有問題？（高雄縣內門鄉東埔村七九號湯博雅）

【答】：（一）仔猪因天氣寒冷，放稻草而發生皮膚病，雖以牛豬安治療未見有效，故可以斷定不是由外寄生蟲引起之皮膚病。本病可以推想爲濕疹。濕疹多由飼養管理不善，環境不潔或猪舍地面潮濕，或有刺激性物質（稻草有小小刺毛），此外營養缺乏（如維他命，礦物質等）亦可以引起濕疹。

治療改善飼養管理、清潔及消毒猪舍及保持猪舍內之乾燥，及溫暖爲先決條件。補給營養（多給青料或魚肝油）及礦物質亦很重要。可以注射葡萄糖鈣、維他命B₂等三到四天。外用治療，先以一%克來蘇兒液洗患部塗抹制酸氧化鋅軟膏或磺胺劑軟膏，每天一到二次即可促進痊癒。

（二）仔猪咳嗽後呈腹式呼吸可能爲寒冷所引起之氣管炎繼發肺炎，治療應以鬆弛素治療，小豬五頭每次用一瓶則可。連用四到五天，如未見效果即改用四還素及氯霉素之併用療法或用長效磺胺劑的注射最好。


穗枯病、穗稻熱病、稻胡麻葉枯病
最新殺菌劑——效果顯著

添米多

テンハイド

農藥登記證1187號

新殺菌·水和劑




使用「添米多」四大優點

- ◆ 稻粒大，熟度整齊，有名符其實之增收功效。
- ◆ 於出穗期所發生穗枯、胡麻病菌、穗稻熱病有顯著的效果。
- ◆ 殘效性長。
- ◆ 對人畜無藥害可安全使用。

農藥登記證1112號

賜滅多

スマイト



原裝進口

紅蜘蛛最新特效藥

- スマイト乳劑本年度新增加推廣之紅蜘蛛藥劑。中名爲「賜滅多」具有下列五大優點：
- ① スマイト乳劑2000倍對各種紅蜘蛛具有速效性，而且有一個月以上長久持效性。
 - ② 對別種藥劑已具有抵抗性之紅蜘蛛亦能獲功效。
 - ③ 與波爾多液及其他一般農藥均可混用。
 - ④ 對人畜無害。
 - ⑤ 物價低廉，使用安全。



製造廠：兼商化學工業株式會社
發賣元：兼商株式會社

總代理：文山企業行
臺北市南京西路416號
電話：542203