

(二)飼料應採用多種類單味飼料配合而成之完全混合飼料，方可不引起營養缺乏之情形，單以木薯粉與大豆粉二種，甚容易引起營養缺乏，對豬的生長及疾病的抵抗都不好。(張聯欣)

豬尿白色粘稠原因多

須先驗尿後治療

【問】：有幾隻豬在畜舍內常發現排泄白色粘稠物在排尿之後，食慾正常，尿液隔日成茶色，這是何病？(南投縣草屯鎮瑞峰里瑞峰路三七號江錦昌)

【答】：豬隻排尿後，排泄白色粘稠物，有下列幾種疾病，即尿路感染、生殖器官感染之可能性，據說該豬食慾正常，如係母豬或此豬則患子宮內膜炎尤其他性子宮內膜炎的可能性比較大。

尿路感染即腎炎、腎臟膀胱炎尿道炎等。依病情的輕重不同，臨床症狀亦略異。需要檢查尿液尿渣等才能診斷。尿量少而濃則呈為茶色，高熱、飲水量減少亦有此種情形。生殖泌尿器官病不宜自行治療須經獸醫檢查該白色粘稠物後治療。(張政宏)

豬赫尼亞病

【問】：(一)剛生出的仔豬，於腹(肚)臍地方生出一個似「瘤」狀，起初很小，漸漸大起來，用手摸很軟，又不感覺痛，不知此種病是什麼？

(二)病源如何？

(三)是否能治癒？

(四)應如何處理？(臺南縣下營鄉茅港村六三之三號戴厚重)

【答】：(一)病名：豬赫尼亞(普通鄉下常誤稱為脫腸者)

(二)病因：由遺傳因子所致為最常見，又有時可由生後臍帶消毒不善而細菌傳染或臍孔閉鎖不全亦會引起本病。

(三)治療：能治癒，請臺南縣當地獸醫作赫尼亞切開術即可。

(四)處理法：手術愈早越好。本病如係遺傳因子所致，將來生產之小豬亦常會發生此病。另時常注意衛生環境以防菌感染細菌而發生本病。(李永基)

可第松及ACTH

可治癒豬水腫病

【問】：(一)關於豬水腫病之治療，應用可第松(Cortisone) ACTH 及抗組織胺劑的效果及使用的劑量如何？

(二)長效性胺劑用於小豬治療與預防，使用的劑量及用法如何？(基隆市中山區和平里和平莊廿二號黃尚仁)

【答】：(一)可第松(Cortisone)及ACTH 對豬水腫病有療效，係根據外國文獻的報告，此兩藥與抗組織胺劑同樣，須應用於輕症才有效，如已病重概無效。可第松的劑量與用法為小豬第一天肌肉注射五十到一百毫克(mg)，次日以後可視病情的減為二十五到五十毫克。ACTH 小豬每日十到十五毫克亦注射於肌肉內。

(二)長效性胺劑，如為10% Sulfamonomethoxine 注射液對於100公斤體重小豬肌肉注射10西西。如為Sulfamonomethoxine 之鈉鹽粉末則第一次每公升體重內服三十到五十毫克第二次以後每公升體重內服十五到三十毫克。預防劑量可減半使用。Deamethasone 每隻每日注射0.115到0.5毫克。(詹益波)

「克孕素」是合成動情素

【問】：(一)「克孕素」的效果如何？用於家畜或家禽據說會發生不良作用？政府是否禁止出售？

(二)「克孕素」的用法如何？(彰化縣埔鹽鄉永樂村大新路九四號黃萬德)

【答】：(一)克孕素係合成雌性發情劑，調整及誘發，子宮內膜的增殖、子宮頸管的弛緩、排卵停滯死胎等排除；家畜早期妊娠診斷等。當然可以用在雌肉豬，使其卵更形成熟永久黃體而不再發情(如名克孕)，提高肥育效果，因此政府許可製售。

(二)為克孕目的應於發情閉止後二到十五日中間注射此種藥劑有時可到達克孕目的(效果不高)。(2)如果用於早期妊娠診斷應用於發情閉止後第十七日，在七十二小時內判定是否懷孕。(3)對不發情之母豬，要誘發



最負責的品質



最老牌的農藥



成長中的 正豐農藥 圖為與世界農化總社 PHILIPS-DUPHAR 合作，佔地廣達萬餘坪的正豐二廠全自動設備粉粒劑部門興建中一覽



正宗殺鼠劑

三共フナトール

農藥登記證019號

用量小，
作用快，
取食後很
快致死。



每瓶30cc 每箱六十瓶

保證品質



三共株式會社 台灣總代理

現貨供應處

正田行

中國化學製藥股份有限公司

台北市新生北路2段149巷13號