

# 農友經驗



## 我種果樹的經驗

平時我常看到許多人，在種果樹時，如柑橘、柳橙、梨、李等，都只把包在苗頭部的稻草除去，挖個洞就把它種下去，致使果樹發育緩慢。現在就依本人所經驗的一些有關種果樹的方法提供給各位：

- (一) 選擇苗木。必需選擇根部健旺無腐爛者。
- (二) 種植前。需把四週土壤鬆鬆，能動得越深越好，範圍越廣越好。因為深、鬆可以保持水分，不讓植後有過乾的現象。並且可使根部容易伸展。
- (三) 種植時把根部伸直。不要有曲拳。
- (四) 種植切忌根部埋得過深。以防爛根。最好能做成一土堆種在上面。
- (五) 種苗後。頭部最好覆蓋一些草，可以保持水分，不使地面太熱。草爛後也可當肥料。
- (六) 苗木澆水。以早晨和傍晚最好中午不澆水。(嘉義縣大林鎮中坑里芎蕉山三〇號林文術)

## 用菸葉水殺蟲

- (一) 摘下菸葉一捆約一公斤，不用晒乾，橫切成小斷片。
- (二) 將切好的菸葉碎片投入一桶水(尿桶)中，浸到桶裡的水變為淡褐色，浸的時間不定約需三到四天。



## 我怎樣栽培蕪菁？

蕪菁是養分很高的飼料作物，可利用閒作栽培，收成好，如用以養豬，可使飼養成本降低，增加副業收入。茲將其栽培要點介紹如下：

- (一) 整地。在第二期作水稻收穫後即翻土耙鬆，做成三尺半的畦。
- (二) 移植。十月中旬移植，株距一尺，行距一尺半，每畦種兩行。
- (三) 除草、施肥、培土。堆肥做基肥用，待蕪菁移植成活後澆尿素水。尿素用量每分地用五公斤。移植後一個月除草並培土、施肥，其施肥量為每分地硫酸安三十公斤，過磷酸鈣二十公斤，氯化鉀五公斤，其後每隔十天澆水肥三次。
- (四) 蟲害防治。較易發生之蟲害為小菜蛾和蓊菜蚜，小菜蛾可噴射六〇%「大利農」乳劑一千五百倍稀釋液。蓊菜蚜可噴射五〇%「馬拉松」乳劑八百倍稀釋液。
- (五) 收成：三月初即可收穫，每分地產量可達一萬三千至五斤。
- (六) 加工儲藏。收穫後製籤，稍曬乾約脫水二〇%後，以每一百臺斤成籤攪拌五臺斤的脫脂米糠，徹底攪拌均勻，然後放入圓形青貯窖中，每例入約半臺尺厚用腳踏實以防空氣滲入而發霉腐爛，堆滿至高出容器邊緣半臺尺後，用薄的塑膠布密封蓋緊，覆上一層半乾濕之泥土，經三、四天後再拉緊塑膠布，覆土半臺尺厚之泥土，上蓋塑膠布防雨沖刷。經二十四天後密封取出飼餵，如此可保存四個月之久而不腐爛，且其氣味芬芳，養分極高，可增進豬的食慾，促進豬的成長。

## 母豬難產怎麼辦？

母豬在日常飼養時，必須要有良好的管理，例如懷胎的母豬，平常應多供應多種飼料，尤其是富有蛋白質的飼料，且每次應配入適量的食鹽和骨粉等。預防母豬便秘，應注意青飼料及多汁飼料的供給，適當的運動，而要生產前四至五日時應減少飼量，並多供給清潔的飲水，以保持母豬本身的健康。

南投草屯上林里  
草溪路三十五號 簡季華



簡季華農友與他所栽培的蕪菁

該請獸醫救助。設法把腹內小豬取出，不然母豬亦有危險。

難產的現象，開始分娩時，先發生陣痛，使母豬臥立不安，在室內走求走去。陣痛後，雖然母豬運用全身的力量，想把腹內的胎兒排產出來，但經過一番努力後，仍然沒有排出胎兒，而母體已漸漸顯出疲倦無力，倒臥地上喘息，此時可斷定是難產。

急救的方法，先將雙手洗淨消毒塗抹潤滑劑(如麻油)愈多愈好，因為麻油有潤滑、消炎的功效。然後把手徐徐的伸入陰道到了宮頸，把橫產(難產)的小豬緩緩扶正然後取出來。這是我經多次的經驗。如果各位農友家居鄉村，緊急請獸醫不方便，不妨照此試試看。(高雄縣內門鄉東埔村二十四號張仙德)

## 泡桐的分根栽植

(一) 泡桐分根放置在陰涼、通風良好處。

(二) 分根前直徑若無〇.五公分以上，最好能選適當苗圃或用破蓋製，待其發芽後再移植至造林地。已成木泡桐根發育較差，最好選用二到三年生的泡桐。

(三) 種植後在表上撒佈BHC、DDT粉劑，如此可避免根線蟲的發生，但應注意不可在發芽後使用，否則有藥害。

(四) 幼芽在萌發時，應避免以水直澆幼苗，否則幼苗容易受到損害。

(五) 每一分根留下二幼芽，待一臺尺高時，留下較好的，第二年整株砍掉。再發芽至五臺寸高時，施放半匙尿素或硫酸，至一米高再放回量尿素，如此在一年中能有三米高的成績。(埔里鎮北環路十五之四號簡鼎傳)