

寶作連 素根開

增
收
關
鍵
在
開
根

爛根性

新稻熱病

防治法

第一期水稻自播種起，即常見黃黃萎萎等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大（其他植物亦然），一般農友均誤認為稻熱病而噴灑水銀劑或西藥生石灰；不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「連作寶開根素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素八公克（瓦），尿素二兩，三日噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著（水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量為宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害）

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用同法防治，平常五～十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。（45公克裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉景平路47之2號
電話：923111 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金，5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔，安全迅速方便無論一包二包無任歡迎）

萬
病
之
源
在
根
弱

再者，生產者也可將產品先予變形之後再行出售，以求較大的利潤。譬如某農家大量生產甘藷，而那一年適逢甘藷價格暴跌，此時農民可多用甘藷飼養毛豬，也就是說將甘藷變成毛豬的形式出售（假定毛豬價格沒有多大變動）。這樣至少可使農家因甘藷價格暴跌所受的損失減輕。

又有有的青果或蔬菜生產者，除了將青果或蔬菜自行採收而運銷外，也可將其存在樹上或田間時賣給商人，由商人負責採收和搬運。

上面所談的，都是作明智的運銷決策時所應考慮的問題。當然要想提高運銷效率，必須時時刻刻注意市場情報，適時採用適當的措施，才能獲得最大的效果。

（5）採取契約生產：農民在栽培作物以前，如能與加工廠或運銷商

訂契約，規定將來的交貨量和價格等，則對農民擬定生產計劃和安定農家收益方面頗有幫助。採用這種方式最大的好處，是可能免除將來價格劇跌的風險，而可把握農家最低的收益。

契約生產的作物，多屬於需要加工的產品，其中以青果蔬菜類居多。在美國採用這種生產方式的很多，近年來在臺灣也有不少產品採用這種生產方法，例如鳳梨、洋菇、蘆筍或菸草等都是。

啓事

本期農業經營特輯，尚有陳希煌「農場經營規模」，范光雷「農業經營機械化問題」，劉世達、簡福智「農業勞動的有效利用」與「農家耕地的有效利用」，余如桐「如何加速本省養豬企業化？」，吳同權「農場作物的選擇和配合」等專稿，將自下期起陸續刊出。

蝦·龍

本省俗稱「龍蝦」，據臺灣食用甲殼類（農復會民國五十四年八月出版）有七種，即：

（1）五色蝦：此種為本省產量最多的龍蝦，分佈於蘇澳、基隆間沿岸，東港、澎湖等。產期為整年而春季最盛。（2）錦蝦：分佈地區為基隆、澎湖和蘇澳、基隆間沿岸。產期整年，三至八月最盛。（3）長腳蝦：分佈於蘇澳、基隆間沿岸，基隆、東港、澎湖等。產期以三至十月最盛。（4）花龍蝦：分佈地區為蘇澳。產期整年，三至十月最盛。（5）文身蝦：分佈地區為大理、福隆等。產期為整年，三至十月最盛。（6）龍蝦：分佈於基隆、東港、澎湖、蘇澳、福隆間沿岸。產期整年，三至十月最盛。（7）函蝦：產地為大理、東港。產期為春夏季。此種價格低廉，每公斤約十元。

目前本省並無養殖龍蝦，所以無人專作採苗生意，但蝦苗可在產地沿岸較淺地方採集。龍蝦的飼料可利用貝類（打碎後餵食）及下雜魚。

據日本方面的報告，龍蝦一年間脫皮九次，平均頭胸甲長為三至三·二公分，第二年經五次脫皮則達五至五·二公分，第三年經三至四次脫皮可達六·七至七公分。

龍蝦的養殖，因龍蝦不易入手，所以目前只能實施蓄養或短期養成。即將體長十三公分左右的小蝦放入池塘蓄養短時間，俟蝦價較高時捕獲出售。（賴永順）