

氣候開始轉暖：

注意蔬菜害蟲「黃條葉蚤」

秦 登

黃條葉蚤是蔬菜的害蟲，俗名跳蚤，本省各地都有發生。

近年來許多蔬菜產區因為防治得宜，這種害蟲已經少見，可是還有許多菜園，尤其是山地的，受害仍然嚴重。黃條葉蚤是在氣候開始轉暖時發生最多，希望菜農們及時注意防治。

一般形態

黃條葉蚤的一般形態如下：

成蟲：體長僅二公厘半左右，屬於細小甲蟲類的一種。它的頭部細小，有一雙黝黑的複眼，和一對絲狀觸角。體軀的顏色，除兩翅中央各有波狀黃色大形縱紋一條之外，其餘各部都是黑色。足三對，後足腿節特別膨大，跳躍如蚤，所以叫做黃條葉蚤。卵：橢圓形，淡黃色，長約半公厘。

幼蟲：淡黃色，頭部黑褐色，體表生許多細毛。胸部有腳三對，體末有尾腳一對，體長四公厘左右。

蛹：橢圓形，淡黃色至暗色，體長二公厘左右。

生活習性

黃條葉蚤每年發生六、七世代，

雌蟲產卵在地面的根或莖上，每處產一粒，孵化後的幼蟲，鑽入土中蛀食菜株根部，使根部形成許多小孔，影響菜株發育。如蘿蔔被害時，表皮可見斑斑小洞，失去經濟價值。幼蟲生活在土中，如挖出根部附近的土壤，很容易找到它。幼蟲成熟後，就在土中化蛹。羽化後的成蟲，爬出土面，

食害菜葉，使葉部成多數小孔，被害嚴重時，菜株即枯死。成蟲很活潑，受驚即跳躍，但早晚稍為遲鈍。

防治方法

(1) 土壤藥劑


H C 粉劑，每分地用六毫斤，或以一〇% D D T 粉劑，每分地六毫斤，在播種前撒佈土面，再翻入土中，使之均勻分佈於表土，再行播種或移植，較為妥善。又如未經上述處理，菜株根部被害時，可以二五% D D T 乳劑加水四百倍，灌注根部以防治幼蟲。

(2) 葉面噴射藥劑 生育期如發現有成蟲為害，可任選下列藥劑之一種防治：(一)二五% D D T 乳劑，加水四百倍。採收二十一天前停止用藥。(二)三五% 安殺涕(殺蟲淨)乳劑，加水一千倍，採收前二十一天停止用藥。(三)五〇% 馬拉松乳劑，加水六百倍，採收前四天停止用藥。(四)五〇% 加保利可濕性粉劑，加水五百至一千倍，採

收前七天停止用藥。

黃條葉蚤的幼蟲(右)和成蟲

噴藥時必須使藥液接觸蟲體，效果才會顯著。



低毒性殺蟲劑 加保利 (Carbaryl)



維多 A


(登記九八二)

防治：蔬菜露菌病、蕃茄及馬鈴薯晚疫病、蔥蒜赤銹病、大豆銹病、柑桔黑星病

Sariaf S.p.A. FAENZA



防治：水稻浮塵子、飛蟲、柑桔蓀菜殺蟲劑



因克命 80

(登記九三七)

曼乃浦 (MANEB)

防治：香蕉葉斑病、蔥蒜赤銹病、洋菇褐斑病、洋蔥紫斑病

和豐	豐	松谷	乳劑	46.6%	登記(1070)	和豐	牌BHC	粉劑	3%	登記(1955)
安	谷	樂	乳劑	50%	(1071)	豐	牌尼	液劑	40%	(1302)
治	蟲	樂	乳劑	50%	(1053)	和	山	乳劑	48%	(1363)
蟲	必	淨	乳劑	40%	(1052)	泰	旺	乳劑	25%	(1364)
滅	枯	速	乳劑	50%	(1054)	菜	力	乳劑	20%	(1373)
滅	蟲	靈	乳劑	6.5%	(1018)	和	減	乳劑	50%	(1375)
殺	蟲	丹	乳劑	25%	(1256)	適	百	乳劑	50%	(1353)
和	豐	牌	粉劑	10%	(1270)	利	賜	乳劑	25.3%	(1332)
和	豐	牌	粉劑	1.5%	(1280)					
				1%	(1288)					

和豐農化廠股份有限公司
彰化縣和美鎮彰新路五號 電話：3518 (彰化市)