

檸檬與柳橙

翁仁祿

檸檬比柳橙生長快

檸檬與柳橙在同一土壤、氣候及同一砧木之下生長時，檸檬生長較為迅速。加以栽培地土壤的不同，砂質土壤較粘質土壤，柑桔根部容易伸長，生長較旺盛。

檸檬樹移植適期在晚秋。二年生檸檬帶大塊根際土壤並修剪地上部（修剪程度視移植距離及地上部地下部之平衡狀態而定）即可移植。

如根部細根少而須移植遠距離時，可在夏芽成熟後在樹冠正投影直下附近挖環狀圓形溝斷根，並於溝內施用腐熟堆肥促進新根生長後在冬季移植。

柑園防風林的樹種

防風林帶可與鄰接園主高洽後設於境界線上，若鄰接園無意設防風林時，視防風林樹種之根羣分佈，而任意種植於園內側，最好在交界處挖深溝阻止防風林樹根部的越界。

有海風（鹽霧）之處以木麻黃，一般山坡以長枝竹為妥。但作為柑桔園的防風林，木麻黃須驅除天牛，長枝竹必行「斷根」工作。

檸檬和柳橙的施肥時期為正月、五月及十一月。檸檬結果期為三月四月及八月九月。

廣東檸檬雖可作柳橙之砧木，但親和力不如酸桔之佳。

酸桔砧木柑高接極柑或晚密西亞，雖可成活但親和性不良，樹勢、收量等均不理想。

敗根及生理病防治

敗根（根部腐爛）原因有地下水過高，施用肥料種類濃度欠妥，或毒素病、根線蟲為害等。

柑桔生長中之線蟲有效防治方法如下：

(一) DBCP 乳劑法：八〇% DBCP 一五〇倍液每間隔三十公分灌入於土中。深十五公分，每處灌入量一百西西。

(二) CDBE 乳劑法：五〇% CDBE 五百倍液，每平方公尺灌入三公升，深度十五公分。

柑桔生理病種類頗多，常見者有銹、鐵、銅、硫、硼、鋅、鉬素等之缺乏症。一般充分施用堆肥時不易發生生理病。

檸檬的將來性，須根據一般生活水準而定，例如飲料、化粧品類之發達程度等。以目前栽培面積及幾年來銷路狀況看來，尚不宜大量種植。

（附註：花蓮縣光復鄉中正路一〇二號羅富美與林資順讀者來信詢問有關檸檬柑桔問題，本刊特請翁仁祿先生撰寫此文。）

國外原裝進口及台灣分裝各種超級優異農藥！！

益收50% (A.S. 50) 可濕性粉劑

最新、速效、長效、強力性 水稻、果樹、蔬菜，浮塵子、飛蟲、褐飛蟲特效藥

愛果旺 (AREDION) 乳劑

各位期待已久的紅蜘蛛特效藥即將進口

使用“愛果旺”1,500~2,000倍對各種紅蜘蛛具有

最速效、最長效的特性，對別種藥劑已具有抵抗性之紅蜘蛛亦有特別效果。

- 50%減速乳劑（專治二、三化螟蟲）
- 50%利榮豐乳劑（專治蔬菜等各種蟲害）
- 80%高山可濕性粉劑（專治各種病害）
- 20%愛果旺可濕性粉劑（專治柑桔紅蜘蛛）
- 愛果旺乳劑（專治柑桔紅蜘蛛）
- 豐華特製新克文“加保利”粉劑（專治飛蟲浮塵子）
- 豐華特製西樂生石灰粉劑（蓬萊、在萊兩用）

- 50%甲基巴拉松乳劑
- 25.5%美文福（富士靈）乳劑
- 40%阿特靈可濕性粉劑
- 50%地特靈可濕性粉劑
- 76%富爾邦（飛邦）可濕性粉劑
- 20%飛佈達乳劑
- 80%錳乃浦可濕性粉劑

所有農藥均領有登記證

豐華股份有限公司

臺北市郵政信箱第3339號