

一般以施用堆肥、水肥、硫酸、過磷酸石灰和草木灰等為佳。肥力中等地以每公頃施用堆肥七千至九千公斤，水肥三千公斤左右，過磷酸石灰一百五十公斤左右為宜。水肥於中耕時施用。其他追肥以硫酸一百公斤和過磷酸石灰混合分三次施用。

每甲收益三萬元

四月播種的「惹政」，到了八九月莖葉變黃，同時大部分果實成熟。此時即可收割。過熟時果實易於脫落，應特別注意勿失適期。收割後，在田間鋪開放置二至三日，使其乾燥，然後用連架脫果。如用迴轉脫殼機更佳。分離後的果實，經篩別風選後，令其充分乾燥。根據山地農牧局在桃園縣、南投縣和臺中縣等山坡地推廣栽培的紀錄

維多 A


(登記九八二)



蔬菜露菌病、蕃茄及馬鈴薯晚疫病、葱韭赤銹病、大豆銹病、柑桔黑炭病

因克命80

(登記證九三七)



錳乃浦

(MANEB)


病斑病、葉赤病、洋蔥紫斑病、洋蔥紫斑病

「惹政」生長期間五個月，每公頃果實收量約三千公斤(成績好的可達五千公斤)，每公斤單價十元，每公頃可得三萬元收益。又因為在山坡地施行等高線密植栽培，且可繼續宿根，所以對於水土保持亦有效益。

荔枝最需有機肥

栽培荔枝所需要的條件是夏季高溫多濕，秋後寒冷無霜害，可稍乾燥，春季開花期間氣候宜晴朗，土壤不宜過乾燥。桃園的氣候有可能栽培荔枝。

荔枝到了開花樹齡，施肥應有一定時期。春夏兩季可充分施肥，秋後為了促使荔枝休眠，應停止施肥。荔枝最需要有機肥料，如人糞尿、豬糞



因克靈50

(登記七六九)

(登記七五七)

水稻浮塵子、柑桔蔬殺蟲劑

和豐安治蟲滅殺和和豐豐牌尼古山旺力減百賜力

豐谷必枯蟲牌尼古山旺力減百賜力

松谷樂樂淨速靈丹敏BHC丁松生松殺靈松

劑乳劑乳劑乳劑乳劑乳劑粉劑粉劑乳劑乳劑乳劑乳劑粉劑

46.6%	登記 (1070)
50%	(1071)
50%	(1053)
40%	(1052)
50%	(1054)
6.5%	(1018)
25%	(1256)
10%	(1270)
1.5%	(1280)
1%	(1288)
3%	(1355)
40%	(1302)
48%	(1363)
25%	(1364)
20%	(1373)
50%	(1375)
50%	(1353)
25.3%	(1332)
80%	(1409)

尿、雞糞或油餅等，都是荔枝的好肥料。荔枝施肥，仍以沿樹冠環形溝施下為最簡便。除濕對任何果樹都不適宜，荔枝也不例外。如有這種情形，應疏除遮蔭，開溝排水。荔枝種植後的第三、四年，便可開花結果。六、七年每株產量可達數十萬斤。荔枝已屆結果樹齡而不開花結果的原因，大多與抽生新梢的時期有關，凡秋後抽生的新梢，到翌年春季多不能形成花芽，即不能開花結果。在秋後灌漑或施肥都可刺激植株抽生新梢。為避免秋後抽梢，須停止秋後灌漑與施肥，令其乾燥，以促使充分休眠，使秋前發生的枝條，能順利形成花芽，到來春自然可以開花。荔枝除接近地面而有礙工作的枝條可酌修剪外，不宜任意修剪。(張)

蘭種何處有售?

普通品種之蘭花種子，在各大蘭園均可以購到。特別貴重者須接洽預約才能得到。通常以果實為計售單位。一般常見之蝴蝶蘭、嘉德麗亞等，普通品種每顆果實自五十元至一百元之譜。較貴重之新品種約數百元不等，以品種而定。普通開花之蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭、喜姆比地蘭、石斛蘭、萬代蘭等，每株一百至二百元可以購到。本省較可靠而有信用之蘭園：高雄市民區建國一路十一號之一(黃珠軍)，臺南市成功七巷二十八號之一(邵禹銘)，臺南市法華街十二號(洪趨完)，臺中市立德街一九四號(周鏡)，嘉義市新榮街六三號(陳承訓)，嘉義市玉峯街一二二號(劉黃崇德)。(呂淑濤)



和豐農化廠股份有限公司
彰化縣和美鎮彰新路五號