

〔豆科植物由於土壤過肥而引起徒長現象，如何改進？

〔本地海拔一千四百多公尺，六月上旬時能否栽種豌豆（臺中九號）？西北兩、颱風的危險性如何？（南抗縣仁愛鄉英村富貴巷九號謝偉謀）

〔可用輪栽其他非豆科作物方法改良。〔上地過肥引起豆科植物徒長可少施肥或施行摘心改進。

〔本省豌豆通常在九月下旬至十一月播種，山地亦有三月播種者，在一千九百公尺高度地區，六月上旬播種可試試，至於生長期中遇夏季陣雨及颱風的機會，自然遠較春秋作為高。（趙致康）

蔬 菜

〔中球大洋葱，要使用何種種子？

〔每分地可以收穫若干磅的洋葱？

〔洋葱自播種至收成，須要多少時期？

〔每分地（一〇公畝）需洋葱種子約三百公克（八磅兩）左右。

〔生產中球洋葱（六〇公分至七〇九公分），只要使用現今推廣的「早玉」、「聖玉」及「勝早玉」品種而適度密植就可生產，就是說生產中球洋葱對於栽植密度有關，如同一品種栽植後，其栽植距離愈密，生產之葱球愈小，單位面積內栽植株數愈多，其總產量也愈高，栽植愈疏，則其生產之葱球愈大，但單位面積內栽植株數愈少，其總產量也愈低。

〔洋葱每分地（十公畝）之產量，對於氣候及栽植密度有關，普通可產五千磅（三千公斤）至一萬二千磅（七千二百公斤）。

〔洋葱自播種至收成之日期，大概需一百六十天左右。（曾紹均）

〔洋蔥後種甘藍 那一個品種最好

〔問：我於一期稻後，欲種甘藍菜，

不知什麼品種最適合栽培，播種後幾天才可收穫？

〔是否會拖慢影響二期稻作播種？

〔何處有售種子，播種前需要何種防預病害措施？

〔我的田地處於高處絕無浸水之慮，但地質為半砂質是否適宜？（屏東縣萬丹鄉寶厝村二十三六號李丁福）

〔播種後約一百至一百零五天可收穫。

〔會影響第二期作，拖慢約七十天。

〔種子「初秋」可向臺北市迪化街臺灣農產企業公司，「初夏時一號」可向三重市重新路三段興農種子行洽購。

〔種子大部份是用兩計算的，若數量多，亦可用磅計算。

〔播種前宜用「賜保根」拌種消毒，適宜栽培。（李樹泉）

〔我養了一頭乳羊生了軟脚病不能站立，請問軟脚病是何原因引起的，要用什麼藥才能治好？（臺北縣內湖鄉石潭村羊稠七之一五號周榮折）

〔如果發軟脚病的乳羊是大乳羊，其原因是：

〔飼料中欠缺鈣及磷，或二者的配合不適宜。

〔飼料中欠缺維他命D。

〔由慢性胃病引起，而不能充分吸收鈣與磷。

〔陽光不足，運動不夠。

〔內分泌系統有障礙。


〔飼料中多給骨粉，每日約二至三兩，或其他的鈣質品，如牡蠣、炭酸鈣、膠質鈣等。

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）



獸 醫

〔我養了一頭乳羊生了軟脚病不能站立，請問軟脚病是何原因引起的，要用什麼藥才能治好？（臺北縣內湖鄉石潭村羊稠七之一五號周榮折）

〔如果發軟脚病的乳羊是大乳羊，其原因是：

〔飼料中欠缺鈣及磷，或二者的配合不適宜。

〔飼料中欠缺維他命D。

〔由慢性胃病引起，而不能充分吸收鈣與磷。

〔陽光不足，運動不夠。

〔內分泌系統有障礙。

〔飼料中多給骨粉，每日約二至三兩，或其他的鈣質品，如牡蠣、炭酸鈣、膠質鈣等。

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

〔肌肉注射 Calcio-ostelin（奧斯得靈鈣針）每日或每隔一天肌注一至二西（按病情及該乳羊的大小最好請問獸醫）

為害水稻的 浮塵子、飛蟲

請趕快使用速效性、效果大

正豐牌 永利農乳劑

正寶殺乳劑



品質正確 效果優良

正豐化學股份有限公司

霧峯：電話63

〔飼料中少給精料，多給粗料，及讓羊多運動及曬陽光。（張政宏）

雞痘疫苗使用法

〔雞痘疫苗的使用方法如何？

〔新城雞痘疫苗，家禽霍亂可否混合，一次注射，又每隔多久要注射一回？（臺南縣下營鄉中營二五四號陳清華）

〔疫苗注射在大腿外側，按陰十五、六根上羽毛後將疫苗塗擦，接種四至五日後觀察發痘情形，如無發痘應再行接種，免疫約二至三個月。

〔新城雞痘疫苗及家禽霍亂菌苗可同時在不同部位注射，但是不宜混合使用，注射時期為四週齡，四月齡二次以後每四個月施實一次為宜。（農復會畜牧生產組劉永利）

〔新發病原因如何，在同等舍內發生後，其他種畜如何預防？

〔豬水腫病如何作有效治療，曾試用水

腫毒無效？（南抗縣草屯鎮碧峰里三七號江錦山）

〔豬水腫病，病因尚未明瞭，有腸毒菌病、中毒、過敏反應（Allergy）、營養缺乏等學說，但可由每個病例分離溶血性大腸菌，故本病與水腫病似有很大關係，本病傳播迅速猛烈故病性劇烈而很快死亡不易救治。

〔本病預防要注意豬舍環境清潔乾燥，及飼料槽、水槽的清潔。同一豬舍中（同窩小豬如有發現病豬無論其他豬有無病，應即時全面治療。

〔水腫病的治療多採取對溶血性大腸菌施予適當的控制。即注射氯霉素長效磺胺劑，腎上腺皮質荷爾蒙，抗組織胺劑，維生素等藥劑。

〔水腫病似無效，此種藥對病症嚴重者，很難救治，僅能對輕症或潛伏期者做為治療及預防之用，故水腫病應早期發現治療最要緊。（張聯欣）