

葡萄

法方定剪

• 終克謹 •

(續上期)

④ 摘心太強時，容易引起副梢和三番枝的發生，影響樹命。


⑤ 勢力強的枝，可在果穗上七至十葉處，當尖端葉尚未定形時，用指尖輕摘。

⑥ 副梢勢力過強，有害結果枝發育時，可從其基部除去，或將基部捻轉，使生長點向下，以抑制其勢力。勢力中等的，可留一、二葉摘去尖端，其他則放任不管。

⑦ 枝葉過密時，可依誘引法改正其配置。如需再改正時，則可將過密的結果枝從基部疏去一、二枝。要想以摘心的方法防止枝條繁茂時，則屬有害無益。又到七月以後，絕對不可施行夏季剪定。

(3) 調節結果：葡萄單依冬季剪定、除芽和結果枝的疏除，其結果量仍易過多，有害果實的品質和次年的生育結果。因此，為維持樹勢，使它每年平均生產多量的優良果實，仍有疏穗和疏粒的必要。

疏穗：疏穗時期愈早，效果愈大。一般容易結果的得拉威，多在開花前施行，但容易落花的



葡萄之結果習性：甲：結果母枝。乙：結果枝。丙：果穗。丁：卷梢。

將其上果穗全部疏去。果穗大的甲州葡萄，勢力中等以上的枝可留二穗，弱枝上只留一穗即可。果穗小的得拉威，一個結果枝可着生三、四個果穗，但發育特別好的結果枝，則可留存三穗，中等枝留二穗，弱枝留一穗即可。甲州三尺和新香等大穗品種，特別強大的枝可留二穗，普通枝則以留一穗為安全。

疏穗不但要注意果穗的大小和形狀，對於果粒齊整等也應加以考慮。又如甲州三尺和新香等果穗很長的品種，如在開花前將果穗尖端剪去四分之一時，不但可獲得果粒整齊的果穗

甲州三尺、早生利貝爾、新香 (Neo Muscat) 等品種，則以果粒確着後施行較為有利。又依果穗形狀，也可以判斷將來結果如何，所以一般以果粒成長至豆粒大小以前，分為二、三回疏去。

疏穗的程度，宜依品種、結果枝強弱、葉面積和擴心程度等而定。弱小枝和構成主枝中的主枝，為減輕枝條負擔，使之充分發育，多

將其上果穗全部疏去。果穗大的甲州葡萄，勢力中等以上的枝可留二穗，弱枝上只留一穗即可。果穗小的得拉威，一個結果枝可着生三、四個果穗，但發育特別好的結果枝，則可留存三穗，中等枝留二穗，弱枝留一穗即可。甲州三尺和新香等大穗品種，特別強大的枝可留二穗，普通枝則以留一穗為安全。

疏穗不但要注意果穗的大小和形狀，對於果粒齊整等也應加以考慮。又如甲州三尺和新香等果穗很長的品種，如在開花前將果穗尖端剪去四分之一時，不但可獲得果粒整齊的果穗

甲州三尺、早生利貝爾、新香 (Neo Muscat) 等品種，則以果粒確着後施行較為有利。又依果穗形狀，也可以判斷將來結果如何，所以一般以果粒成長至豆粒大小以前，分為二、三回疏去。

疏穗的程度，宜依品種、結果枝強弱、葉面積和擴心程度等而定。弱小枝和構成主枝中的主枝，為減輕枝條負擔，使之充分發育，多

將其上果穗全部疏去。果穗大的甲州葡萄，勢力中等以上的枝可留二穗，弱枝上只留一穗即可。果穗小的得拉威，一個結果枝可着生三、四個果穗，但發育特別好的結果枝，則可留存三穗，中等枝留二穗，弱枝留一穗即可。甲州三尺和新香等大穗品種，特別強大的枝可留二穗，普通枝則以留一穗為安全。

疏穗不但要注意果穗的大小和形狀，對於果粒齊整等也應加以考慮。又如甲州三尺和新香等果穗很長的品種，如在開花前將果穗尖端剪去四分之一時，不但可獲得果粒整齊的果穗

甲州三尺、早生利貝爾、新香 (Neo Muscat) 等品種，則以果粒確着後施行較為有利。又依果穗形狀，也可以判斷將來結果如何，所以一般以果粒成長至豆粒大小以前，分為二、三回疏去。

● 防治紅蜘蛛特效藥

賜滅多

スマイト

● 水和硫黃霸王

谷樂農

コロナ

● 水稻綜合殺菌劑特效藥

添米多

テンハイド

● 浸透性 | 萬倍展着劑

亞久力

アグラー



發賣元 兼商化學工業株式會社

總代理 文山企業行

台北市南京西路416號

電話：542203 號