

中華民國七十五年十月六日

間溫度，使適於播種或移植。
水源充足的地區，注藥後應立即灌溉一次，以增加藥效。

黃麻炭疽病

為害情形

發生於黃麻全生育期間，包括幼苗、葉片、蒴果和種子等。受害幼苗呈現立枯型病狀，倒伏地面，萎凋枯死。成株莖部受害時，呈現黑色或黑褐色病斑，逐漸乾燥，凹陷中央部褪色而裂開。受害部份易被強風吹折，纖維變色脆弱，影響纖維品質很大。

防治方法

①栽培抗病品種，如「臺農一號」。
②注意多施鉀肥，勿偏施氮肥。
③注意排水。
④白健全無病株採種。
⑤黃麻種子先以有機汞劑「谷樂生」拌種○五克或「地樂生」拌種劑一克，或用有機汞劑「利我農」乳劑一千倍液種一小時，可有效防治幼苗期炭疽病。



赤潮後耕前種播

黃麻立枯病

為害情形

在本省中南部的砂質土壤發生較多，為害幼苗、葉及莖。莖部受害時產生褐色或灰黑褐色斑塊，上面散生許多小黑點。病斑環繞莖部，使麻株枯死。

防治方法

①本病菌生存在土壤內，所以防治較為困難。應注意肥料配合，盡可能多施鉀肥。②本病原菌

黃麻白絹病

當在排水不良的麻田嚴重發生。病莖接近地面部產生白色絹絲狀菌絲和黃褐或茶褐色粟狀菌核。受害株容易倒伏枯死。

防治方法

①長期下雨後，注意田間排水。
②本病發生嚴重的土地，應於冬季實行深耕，將菌核深埋在土中，連續栽植禾本科作物二至三年，或積水數月以上。
③病原菌在土壤內生存，又可在未腐熟堆肥內繁殖，所以不要施用未腐熟的堆肥。

牌卦八
註冊商標

裕台

進口分裝

效果顯著

加保利 · 黑尾浮塵子、褐飛虱
愛克司 · 潛葉蛾、粉介殼蟲
藍銅粉 · 刺繩象、二化螟蟲
高銅粉 · 瘡痂病、黑星病
黑腐病

司克愛

利保加

高銅粉

藍銅粉

裕台公司總經理處

台中市大安農藥行

台中市永樂街一號

電話：三五
一六

廠工化業農司公限有份股業企台裕

四四〇三：話電·號六二一路西華中市化彰：址 廠
號 四 十 六 路 陽 衡 市 北 台：司公總