



狀徵害為蟲毒腐根麻黃

黃麻腰折病

為害情形 為害幼前期。在幼苗接近地面莖部產生黑褐色病斑，自病斑處凹陷後倒伏枯死。三月份以前播種的黃麻苗，因地溫低且水份不夠，所以幼苗生長緩慢而易被本病原菌侵害。播種後經四星期以上的，患病率銳減。本病原菌生存在土壤內，可為害多數旱地作物。

防治方法 ①播種時覆土不宜太厚，以促進種子發芽和幼苗生長。②為使幼苗健全，可施用適量基肥，並注意排水。③實行種子消毒，保護幼苗生長。方法和炭疽病防治法相同。

黃麻白粉病

為害情形 本病常在十二月至次

年四月間在晚播黃麻區發生，為害葉片、莖部和蒴果。病株產生白色粉狀物，蓋覆於被害部上面，使葉片早期脫落，全株枯萎。

莖梢折斷症

為害情形 五、六月間雨水特多，黃麻幼小，莖幹生長特別快速，新生長的內部莖組織木質部和纖維束尚未成熟，組織幼嫩，特別脆弱，如有輕微病斑，或害蟲銹痕，或機械傷害時，一經風雨吹打，即易折斷。這種折斷現象，近年來在黃麻產區普遍發生，應特別留意。

防治方法 一旦發生，則無治療方法。預防的方法是減少田間害蟲和病害，增施鉀肥，強化並加速新生組織內纖維的產生成熟等。

殺草劑藥害畸形症

為害情形 黃麻田前作物如會施用二、四-D殺草劑，或當黃麻生長期間鄰近田地施用是項殺草劑，藥劑因風向關係吹到黃麻株上，即可發生葉片狹長、皺縮、麻株生長頓形掉折等畸形現象。

防治方法 ①前作物如會施用二、四-D，應先行灌溉後再播種黃麻。②黃麻對二、四-D至為敏感，所以要想在鄰近田地施用或噴射二、四-D時，應注意風向，並嚴防噴有二、四-D的田間積水流入麻田內。

● 防治紅蜘蛛特效藥

● 水稻綜合殺菌劑特效藥

賜滅多

スマイト

添米多

テンハイド

● 水和硫黃霸王

谷樂農

コロナ

● 浸透性！萬倍展着劑

亞久力

アグア



發賣元 兼商化學工業株式會社

總代理 文山企業行

台北市南京西路416號

電話：542203 號