

## 維多A


(登記九八二)



蔬菜露菌病、蕃茄及  
馬鈴薯晚疫病、葱韭  
赤銹病、大豆銹病、  
柑桔黑星病

## 因克命80

(登記九三七)



錳乃浦 (MANEB)

香蕉葉斑病  
香葱亦銹病  
洋芋褐斑病  
洋葱紫斑病

Sariaf S.p.A. FAENZA

## 因克靈 50

(登記七六九)

水稻浮塵子  
飛蟲  
柑桔蔬菜殺蟲劑

## 因克靈 80

(登記七五七)

SARIAFOS M 50 E.C.  
M 40 E.C.

## PANTRIN 85% W.P.

## UCb M. Parathion 50%

|     |       |
|-----|-------|
| 乳劑  | 46.6% |
| 乳劑  | 50%   |
| 乳劑  | 50%   |
| 乳劑  | 40%   |
| 乳劑  | 50%   |
| 乳劑  | 6.5%  |
| 乳劑  | 25%   |
| 乳劑  | 10%   |
| 乳劑  | 1.5%  |
| 乳劑  | 1%    |
| 乳劑  | 3%    |
| 粉劑  | 40%   |
| 粉劑  | 48%   |
| 粉劑  | 25%   |
| 粉劑  | 20%   |
| 粉劑  | 50%   |
| 粉劑  | 50%   |
| 水溶劑 | 25.3% |
| 水溶劑 | 80%   |

(本農藥均有登記證)

和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路五號

TRICHLORFOND

松谷樂淨速靈丹敏  
速BHC BHC  
豐豐牌牌尼古丁  
豐豐牌山旺力減百賜力

和豐安治蟲滅殺和和  
和泰菜和適利和特

## 種植

# 薑的種植、施肥、病害和銷路

李樹泉

## 銷路

薑要依一定的行距開溝種植。溝的深淺，平地有灌溉之地宜淺，約十五公分；山坡地及乾燥排水良好灌水不便之輕鬆地宜深，約三十公分。溝寬約二十五公分。溝中先施下基肥，鉀十公斤和過磷酸鈣四十公斤作為基肥。第一次追肥於播種後約四十五天，新枝高約二十公分時施用，施用量為糞尿三百公斤，硫酸鋅二十公斤，過磷酸鈣十公斤，氯化鉀五公斤。第二次追肥在播種後約八十天時施用，施用量為糞尿四百公斤，硫酸鋅三十公斤，氯化鉀七公斤。第三次追肥在播種後約一百二十天時施用，施用量為糞尿五百公斤，硫酸鋅三十公斤，氯化鉀八公斤。

薑的施肥方法：每分地施用堆肥二千五百公斤，草木灰二百公斤，氯化鉀十公斤和過磷酸鈣四十公斤作為基肥。第一次追肥於播種後約四十五天，新枝高約二十公分時施用，施用量為糞尿三百公斤，硫酸鋅二十公斤，過磷酸鈣十公斤，氯化鉀五公斤。第一次追肥在播種後約八十天時施用，施用量為糞尿四百公斤，硫酸鋅三十公斤，氯化鉀七公斤。第三次追肥在播種後約一百二十天時施用，施用量為糞尿五百公斤，硫酸鋅三十公斤，氯化鉀八公斤。

鉀肥的肥效很顯著，無論生產嫩薑或老薑，要使肉質緊密，香氣濃郁，色澤優美，均須施用多量鉀肥，尤其在老薑栽培時不可缺少。石灰（鈣質）可以增進薑的形狀，色澤和產量，宜在整地時施用七十五公斤左右。薑的生育期較長，所以遲效性有機質肥料較為合用。

## 病害

園地排水不良，肥料不足，或受暴風雨損害時，都容易誘發菜枯病。防治法：①充分施用堆肥而不使斷肥。②發病初期開始噴射四一四式石灰波爾多液加展着劑，每隔十天一次，

謝在光，臺中縣豐原鎮博愛街南陽里四十四號陳清標，花蓮縣光復鄉大馬村三鄰三十五號王連志和臺東縣卑南鄉溫泉村十鄰二號湯天送等幾位農友來信詢問薑的種植、施肥、病害和銷路等問題，本刊特請臺北區農業改良場園藝股長李樹泉撰寫此文。○

繼續三至四次。③注意排水。