

無 花 果

李 信 芳

無花果又名爲映日果、優曇鉢、阿駝、底珍樹及蜜果等，原產在埃及附近，即非洲北部、歐洲南部、亞洲西部至地中海沿岸等地方。約於公元前四千年已有栽培，在埃及金字塔內就見有此種果樹圖畫記載，故爲最古老果樹作物的一種。它與桑椹、麵包果、菠蘿蜜、猴面果及愛玉子等同屬桑科植物，在本省都是少見的果樹。

所謂無花果並非不開花而結果，主要因爲它是一種隱頭花序，許多小花埋藏在一中空洋梨形的總花托內（如附圖），構成一種合生果

發育肥大即成爲果實的主要食用部分，果實隨新梢生長陸續着生於葉腋間，在臺灣五月至十月間可不斷採收。成熟果實長約五至八公分，有青、白、紅赤及紫黑等四種，果肉微帶酸味，軟甜可口，含有特殊成份能助蛋白質消化，可以幫助消化，治療便秘，除供生食外，可製果乾或果醬，葉片也可作爲中藥的藥料。


就栽培上來說，無花果爲亞熱帶的落葉果樹，性喜高溫乾燥的氣候，冬季略需冷涼，土壤則宜濕潤肥沃而排水良好的壤土，結果期間若雨水太多，果實品質極易變劣且容易凋落，又因無花果的葉片肥大枝條脆弱，最忌強風，所以本省除試驗機關及零星觀賞者外，尚未見有大規模的經濟栽培，但根據世界著名無花果乾產地氣候情形比較，如美國加州中心產區一

年平均氣溫爲攝氏十五・六度，最高二十二・七度，最低八度，有興趣的農友仍可選擇適地試行栽培。茲將有關栽培管理問題敘述如下：

①無花果，樹型多爲灌木或小喬木，高度可達到五、六公尺，多風地區最好採用低幹自然杯狀形或圓頭形整枝，於十二月至二月落葉期間定植，行株距是三至五公尺，三年後可開始結果。

②無花果大都爲雌雄兩株，少數爲雌雄異株，一般品種均著單獨結果，故非特別品種，無混植授粉問題發生。

③果實隨着新梢生長，陸續着生於發育中等的枝條上，故除生長茂密或強盛的徒長枝外，不必過份修剪。



無花果形態

中日合資

三笠農藥

日本技師駐廠配製・成份準確・藥效確實(均有合格登記證)

註冊



商標

新發售

米富馨

MIPC

ミ プ シン

黑尾浮塵子・飛虱
最速效：長效藥劑

台灣三笠化學工業股份有限公司
日本三笠化學工業株式會社 合資
彰化市大竹里大竹莊145號 電話2633號