

農友經驗



甜椒灌水與施肥

甜椒是一種較耐濕、耐肥的作物，因此應特別注意對於灌水和施肥，才能提高品質和產量。

甜椒的耐濕性僅次於茄子，最忌乾燥。土壤若過於乾燥，不但發育阻礙，且會導致落果多，畸形果亦多的現象，影響商品價值，使產量低落。因此應當適時適量的灌水，保持土壤的濕潤，應隔五至七天灌水一次。

甜椒的枝條脆弱，易於折斷，因此不偏重氮肥，氮肥若施用過多時，枝葉會過於繁茂，更加使枝條脆弱，容易落果，果實肉薄，畸形果亦多。應併重磷鉀肥，多施磷鉀肥，可使根系壯旺，枝條健強，着果多，果形整齊，肉厚有光澤，抗病害等好處很多。


三要素的施用比例為氮十二、磷十、鉀十。（臺南縣後壁鄉嘉茂村一八號邱玉書）

我的農家經驗談

(一) 果園除草—覆蓋

前兩年我家有一塊香蕉園，因蕉價不理想而廢耕，以後改種柑桔後滿園都是雜草，除不盡，時常僱工除草，不但浪費工資而且又非希麻煩。後來我改用蔗葉全園覆蓋，厚約

間與人



如何趕走老鼠

當老鼠很多，貓與其他方法都無

法驅除時，我引一本書報導的辦法：把捉鼠機捉到的大老鼠，用紅色的漆把老鼠全身擦遍，再把牠放回，老鼠就會急跑回洞內，但因牠全身變紅，結果把所有的老鼠都驚走，我試過很有效。有興趣者不妨試試看。（宜蘭縣羅東鎮仁愛里一四〇號張界靖）

這樣，不但可以清潔田間，減少病蟲害的潛伏，而火灰更可以增進土壤物理性質。（臺南縣玉井鄉中正村斗六仔一四二號呂東松）

到日光，都黃化且逐漸枯萎而死。翌春以後雜草完全沒有了，可知覆蓋的功效非常好，此種覆蓋也可應用在平常行間很少耕作的作物園裏，如宿根蔗園。

(二) 廢物利用

最近由於紐西蘭兔的引進，兔毛應用於布料與裝飾方面很多，因此兔子的飼養與日俱增。但是若用木製的兔籠子，內面柱子或隔板的兩邊常會被兔子啃得不成形或全部啃掉，若在這些易為兔子啃到的位置上，加釘些廢鐵皮，則這種現象即可減除。

(三) 方便的小工具

養豬是本省農家重要的一種副業，而清除豬糞尿，更是農家所不可缺少的工作，而且是經常的工作。普通都用水杓加長的竹柄去取豬糞尿，工作起來很方便，而且每次所取的豬糞尿不多，對時

力浪費不少。若改用有橫桿的小水桶，發現草都已萌芽（按草種子萌芽條件為溫度、空氣、水分這三個外界因子適合便萌芽），可是萌芽後的雜草因在蔗葉下見不到日光，都黃化且逐漸枯萎而死。

翌春以後雜草完全沒有了，可知覆蓋的功效非常好，此種覆蓋也可應用在平常行間很少耕作的作物園裏，如宿根蔗園。

木薯殘枝的處理

有了好的品種，飼養起來，本輕利厚。但若品種不好，不但飼養期間長，獲利極少，甚至於虧本。所以在供飼前必須要施行選種的工作，下面幾點是我的小經驗：

一般人木薯收穫後，都將木薯殘枝堆積於田邊或溝旁，日久枝葉重生，不但影響田間通風、日照，且易潛伏蝨牛、蟋蟀等害蟲，尤其老鼠、田鼠做穴，以至崩潰田畦，甚為不利。

依我的經驗，是將殘枝堆積於田間，以甘蔗葉助火燒，此時因枝葉水分太多，因此不能完全燃燒，但此次燃燒，却可加速枝葉水分蒸發，差不多再過一星期後，枝葉已經相當乾燥，略為引火，即可完全燃燒。

這樣，不但可以清潔田間，減少

病蟲害的潛伏，而火灰更可以增進土壤物理性質。（臺南縣玉井鄉中正村斗六仔一四二號呂東松）

一般農友，都認為雞是一種雜食的動物，隨便倒些殘飯菜渣餵食，就可生長產卵，無論任何一個鷄蛋都可用來孵化飼養，其實這是一種錯誤的觀念。

養雞選卵小經驗

有了好的品種，飼養起來，本輕利厚。但若品種不好，不但飼養期間長，獲利極少，甚至於虧本。所以在供飼前必須要施行選種的工作，下面幾點是我的小經驗：

(一) 選擇好的產卵鷄，其產卵率要高，週期長，而無患過任何疾病，方可做種鷄，所產的蛋可用來做種卵。

(二) 蛋的重量約在五十五六十公分之間，過輕或過重，均不宜採用。

(三) 蛋的顏色，因品種有異，各有不同。產蛋用的大多是白色，肉用種多是深褐色，兼用種的則是淺褐色。

(四) 蛋的形狀要正常，凡屬畸形，不可用來孵化。

(五) 用手指輕彈蛋殼，會發出木質聲音的為佳，有金屬聲音的，便是劣蛋。

(六) 蛋殼厚薄不勻，粗糙不平，過期以上的，可能孵化率會減低，故不宜孵化。

(七) 蛋殼厚薄不勻，粗糙不平，過於污穢均不能做種蛋。

(八) 蛋殼在未供孵前，貯藏應選擇空氣流通，溫度不易變化的陰涼乾燥處，普通溫度約在華氏五十五度，如果超過華氏六八度，其胚便會有開始發育的可能。每日要翻蛋一二次。（雲林縣西螺鎮振興里十八號廖重植）