



口服避孕藥

你有什麼問題嗎？

· 芬雪蔡 ·

服用具有避孕功效的藥物，稱為口服避孕法，通常簡稱為口服藥。

問：口服避孕藥有幾種？

答：中華民國婦幼衛生協會所供給的是「安避靈」(Orin)及「安無妊」(Primovlar)。

問：口服避孕藥的成份是什麼？

答：口服避孕藥含有黃體素和動情素。這兩種成份和婦女體內所分泌的女性荷爾蒙相似。

問：服用口服避孕藥為何可以避孕？

答：婦女服用口服避孕藥後，即有下列作用：

(一) 卵巢的排卵作用受抑制。

(二) 抑制子宮內膜的發展，使受精卵不能發育。

(三) 子宮頸管內粘液變性，精子不容易進入子宮內。

發生以上任何一種或數種情形時，即可達到避孕目的。

問：口服避孕藥的避孕效果如何？

答：如果服用方法正確的話，極少數的人，在服用第一個月份時有失敗的可能，但自第二個月份以後，避孕效果達百分之百。

問：服用口服避孕藥，是否需再使用他種方法？

答：剛開始服用的第一個月，為了絕對安全起見，最好同時使用別種方法。到了第二個月以後，即不必同時使用其他方法。

問：口服避孕藥正確的服用法為何？

答：月經來潮日為經期的第一天。自經期的第五天，開始吃下第一片口服藥。此後每天吃一片，連續吃二十一天（三星期）。連續吃二十一天後，就停吃七天（一星期）。停藥七天後，接著服用第二個月份的口服避孕藥。此後，均按吃藥三星期，停藥一星期的方法服用。

問：服用口服避孕藥一段時期後，因故停用，以後再服用時，應如何服法？

答：仍自月經週期之第五日開始服用。

問：服用口服避孕藥，有什麼副作用？

答：服用口服藥的頭三個月內，可能有下列現象隨之發生：

輕微的噁心、嘔吐。輕微的頭昏。微感乳房脹痛。體重稍稍增加或減少。

經期中出血。月經量減少，來經日縮短。

問：服用口服避孕藥後，若有上述現象發生時，如何處理？

8種綜合效果的傷風治療藥！

含有維他命 B 1 能迅速恢復體力

恢復體力



● 寄回強力傷風克空盒20片裝三個，6片裝六個附郵五角寄來台北郵政信箱3096號，即奉贈精美豪華明星彩色月曆卡一組（五張）。
● 加倍寄來空盒附郵一元，即贈高級手巾一條，多寄多送。

● 主治：四季感冒、流行性感冒、咳嗽、頭痛、關節痛。



新萬仁化學製藥股份有限公司
中縣衛驗許字第5415號

