

ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19103 U.S.A.

KELTHANE* EC

紅蜘蛛·特效藥！
開路生乳劑

自三月一日起
每購買一公升者
贈送精美擴大鏡一支

農林廳農葯登記證第 925 號

以新姿態出現的開路生乳劑比
開路生可濕性粉劑更有效防治
蛛蟻開路生乳劑加水攪拌後即可
乳化。

現貨供應：惠光貿易有限公司

臺灣總代理：青象貿易有限公司

台北市漢口街壹陸肆肆號深壹壹室
電話：二四九七一

*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標

◎說明書函索即寄

答：輕微的噁心、嘔吐、頭昏及乳房脹痛等現象，於服用兩、三個月後，即會自然消失。體重增加或減少一、二公升後，就會停止。經期中出血：如為點狀出血，應每日吃兩片藥，到出血停止，才恢復一天一片。但仍需吃足二十一天。如量多出血，應即停止吃藥，於出血口算起的第五日，開始吃另一個完整月份（即二十一天）的藥。

月經量減少，來經口數縮短等，並無大礙。如有一次月經不來潮，沒關係，仍於停藥七天後，開始吃藥。如連續兩個月月經沒有來潮，應請醫師診查。

問：服用口服避孕藥後，月經是否照常來潮？
答：通常於服用口服避孕藥三星期而停止吃藥兩三天後，月經即來潮。

問：服用口服避孕藥應注意什麼事？
答：必需按規定每天吃藥。如果兩片藥服用時間，相差三十六小時以上，就有懷孕的可能。養成定時吃藥的習慣，在晚飯後吃藥最好。因為晚飯後不久就睡覺了，如此可以減少噁心、嘔吐及頭昏等現象的發生。

問：忘記吃藥時怎麼辦？
答：一天忘記吃藥，於三十六小時以內，想起來，可隨時吃一片，並於規定時間再吃一片。



家庭計劃推廣教育展覽會

（美素陳）會農縣林雲：下。（雄金彭）會農鎮東什：上

法。問：如果再生小孩時怎麼辦？
答：只要停止吃藥，即有懷孕可能。

問：停用口服避孕藥後，月經是否照常來潮？
答：停藥後的第一、第二個月，月經可能延遲來潮。自停藥後第三個月起，月經即可恢復正常。

問：是否每個婦女都可以服用口服避孕藥？
答：服用口服避孕藥以前，需由醫師做全身檢查，以決定是否服用。

連續兩天或兩天以上忘記吃藥時，如發現出血，應停止吃藥，於出血之第五天，開始吃另一個完整月份的藥。（通常停藥兩、三天，月經即來潮。）如無出血現象，仍每天吃一片，直到吃完本月份的二十一片為止，在這個月裏可同時應用其他避孕方法。

問：生產、流產或打胎後多久，可以開始服用口服避孕藥？
答：生產後不論月經是否來潮，生產後六週即可開始吃藥。如在月經尚未來潮時即開始吃藥的話，通常服用一兩個月後，即有月經的來潮。流產或打胎後，應於下次月經來潮的第五日開始吃藥。

問：授乳婦人可否服用口服避孕藥？
答：可以，因為口服避孕藥對小孩並無不良影響。吃藥後，乳汁分泌量如因之減少，且必需授乳時，最好停止吃藥，改用其他方法。