



農友經驗

栽培早生甘藍

我栽植早生甘藍有多年經驗，現將我的經驗提供於下：

(一)品種：如以適應性來說，以本地種在來種為宜，因本地種較耐青種耐暑、抗病強，故雖本地種球莖較小，但還是較新青種為優。

(二)土壤：因夏季較熱濕，故須選土壤含有機質較多而土層深厚者，尤以苗床要多孔，土壤鬆鬆，排水方便的地方。

(三)播種期與管理：早生甘藍播種期以五月下旬至六月上旬為宜，而每分地種子量在一兩二左右，苗床宜搭棚，遇大旱要蓋草，如天雨才宜蓋塑膠布。播種後，早晚澆水，保持濕潤，以利發芽，到了第一期作水稻收割完過二星期到三星期，即可移植本圃，移植需選暖涼的下午，因早生甘藍球莖小，故株距四十五公分，行距六十公分，一畦種兩行。移植前需先澆水，植本圃宜淺植，不可深植，或只用一小塊土蓋上根即可。移植後即用大葉或稻草遮蔭，移植後，每日早晚澆水或灌溉。

(四)施肥及病蟲害：甘藍是葉菜類，故施用肥料以氮素為主，可用堆肥、人糞尿、硫酸做基肥。追肥可用人糞尿（稀釋水三倍用於澆水）硫酸銨、氯化鉀、過磷酸鈣等。於每次施肥

前，舉行中耕除草，施肥後再覆土，並加以少許培土。病蟲害如幼苗時發現即可拔除，或以用BHC或DDT粉劑撒佈或以乳劑加水噴射，總之，施用農藥在收穫前二、三星期不可施用。
(福興鄉秀厝村二十五號梁財經)

選用刺竹做籬笆

種刺竹做籬笆，有幾個優點：
(一)美觀：青翠挺秀，淡雅清幽，生意盎然，饒有風韻，詩情畫意。

(二)防颱：刺竹高大而彈性極強，每當颱風來襲，風來則伏，風去則起，起伏如波，從不折斷，蔽護房舍。
(三)防盜：株距緊密，枝葉紛繁，任何動物，均難通過；鷄鳴狗盜之徒，對它唯有望竹興嘆。

(四)每年尚可增加一筆額外的收入：將過多或過長的竹子砍下，可編造香蕉籠，又可製線香或充建築材料。

(五)栽培簡便：每逢春季，將二、三年生的新竹砍下截成數段，每段有兩個竹節，然後再將截好的竹竿，分三排埋入深約十至十五公分的泥土。

刺竹性喜溫暖濕潤，如遇天氣過旱，栽培時宜將截好的竹竿，在竹節處鑽一小嘴，用清水注入竹竿內，如此可提高發芽率，使竹子更容易成長。再者如將一年生的新竹，連根掘起，將竹枝鋸短（約一公尺），加以移植，成活率亦高。（竹南鎮港墘里七十六號蔡有仁）

如何醫療牛中暑

在悶熱的夏天裏，牛最容易患中暑（臺灣俗稱的「熱到」）。中暑的原因是悶熱的天氣裏，牛操作的時間太長，往往到烈日當空的正午還不給牠休息，或負荷過重所致。

現在我把牛中暑的簡易醫療法，提供如下，以供農友們作參考。
要知牛是否中暑，可從牛的眼部看出，中暑的牛眼部呈現紅腫、流血

淚，且有下痢等症。因此，當發現牛流眼淚或眼睛紅腫時，請用鹽水用口噴入牛眼內或用醫尼西林塗抹牛眼的紅腫處，這種方法是非常有效的。

或者用「茄冬葉」與「六月雪」放入鍋中，加以煮沸後，將其汁盛起，待冷後和少許食鹽一起攪拌，然後再用自做的竹筒灌入牛的口內，這樣一連做了三、四次後，不但中暑可即速好轉而且又可增進牛的食慾與促進消化。（花蓮縣富里鄉東里吳美仁）

我在金門栽培花椰菜

金門金沙鎮 李有恭
興村四十一號

金門夏季蔬菜，以早生花椰菜最具栽培價值，但由於管理失當，一般農友，對於栽培早生花椰菜，每多不能得到理想的收穫，依我經驗所得，應注意下列幾點：

(一)品種的選擇：大部份農友都不大願意購買較貴的品種，而常為劣品種所誤。又市上一般種子高，不願信譽，常以劣品種代優品種，以圖厚利，或者以陳年舊種子出售，此對農友損失甚鉅，影響生產量至大。故為保險品種優良純正，最好能親自向信用可靠的種子行連絡採購。

(二)育苗管理：金門多數農友，對於種子育苗，一般均採取放任方法，很少注意管理，種苗過於稠密，以致發育不良，苗株纖細，定植後成活緩慢，生長未達理想，且拖延前期，使生長發育未全即出現花蕾。

理想的播種，須將苗圃消毒後，施下適量基肥，種子播後覆土再撒上一層薄薄的廐肥（金門無堆肥），使發芽後，子葉豐滿濃綠，以後每五、六天施一次稀釋人尿糞，俾發育迅速。

在本葉出現時，若過密應加以間拔或適時移植，並定期噴撒防病、蟲害藥劑。通常早生花椰菜苗期為二十五天至三十天為最理想。

(三)基肥的施用：施用基肥，種苗初成活後即可吸收到肥分，同時下雨期間，因基肥的持久性，不致缺肥而影響生長。

(四)管理病蟲防治：定植後每星期施肥一次，第一次以人尿糞五擔稀釋，或硫酸五公斤，於定植後三天施用，以後視生長情形酌量增加，施於距菜株葉稍一寸處。

金門一般農友把一切病蟲害都歸於天然，很少使用防病藥物，故欲保生長順利，最少要噴防治病害農藥（大生七十八或大生二二）三次以上，蟲害以保必安八百倍噴撒，對金門常患的青蟲小菜蛾最為有效。