



果樹

冬季低溫不足
梨樹不易結果

【問】：(一)我在島東(海拔四百公尺)種了一些橫山梨樹，到現在已經十年了還未見開花結果，是何原因？
(二)補救方法如何？

【答】：(一)有關梨樹參考書籍，何處有售？
(二)梨樹是否每年結果二次？(臺北市旭化街二段一九〇卷十二號謝份)

【答】：(一)根據所述，主因冬季低溫不足及生育過於旺盛，故不易開花結實。
(二)應增加磷、鉀肥，不施氮肥，並儘量將強枝用繩索誘引彎壓下垂，以抑制生育，促進花芽形成，可望結實。

【答】：(一)有關梨樹栽培參考書籍，中文專著甚少，日文較多，可向各大書局訂購，隨函附上「梨樹施肥法」與「梨樹修剪法」兩冊，略供參考。

【答】：(一)龍眼花穗之多少是否與氣候有關，在何種溫度下抽穗最多？
(二)龍眼有何嚴重的病蟲害？

龍眼繁殖
可用空中壓條

【問】：(一)龍眼花穗之多少是否與氣候有關，在何種溫度下抽穗最多？
(二)龍眼有何嚴重的病蟲害？

【答】：(一)龍眼花穗之多少與果實採收後的抽梢情形有關。如營養正常，採果後不久即可抽生新梢者，翌年便可抽生花穗。如抽梢太遲，未達適當成熟，便不開花。
(二)龍眼很少有嚴重的病蟲害。荔枝果蛀蟲常可為害部份果實，造成落果，但亦不甚嚴重，可不予防治。

【答】：(一)龍眼花穗之多少與果實採收後的抽梢情形有關。如營養正常，採果後不久即可抽生新梢者，翌年便可抽生花穗。如抽梢太遲，未達適當成熟，便不開花。
(二)龍眼很少有嚴重的病蟲害。荔枝果蛀蟲常可為害部份果實，造成落果，但亦不甚嚴重，可不予防治。



葡萄冬季剪定
產量豐·樹勢穩

【問】：(一)葡萄第一年結果(一年生)現滿枝叢叢但近日發現下枝葉片逐漸枯黃，是何原因？
(二)葡萄冬季修剪時，本年結果枝是否要剪掉？(高雄市左營區維三路合羣里一八七號黃慶寬)

【答】：(一)第一年結果即已結果叢叢，並非發育正常的現象，因為一年生的樹尚未充分發育，結果太多時消費養分太多，容易招致衰弱。此時最好當發生花穗時，盡量疏去大部的花穗，使結少數的果即可。
(二)葡萄冬季剪定時，本年結果枝，不一定剪掉，因為今年的果枝，基部嫩芽到明年仍可發生結果枝而結果，但太多時或有優良的發育枝可剪掉。(葉克終)


【答】：(一)第一年結果即已結果叢叢，並非發育正常的現象，因為一年生的樹尚未充分發育，結果太多時消費養分太多，容易招致衰弱。此時最好當發生花穗時，盡量疏去大部的花穗，使結少數的果即可。
(二)葡萄冬季剪定時，本年結果枝，不一定剪掉，因為今年的果枝，基部嫩芽到明年仍可發生結果枝而結果，但太多時或有優良的發育枝可剪掉。(葉克終)

【答】：(一)第一年結果即已結果叢叢，並非發育正常的現象，因為一年生的樹尚未充分發育，結果太多時消費養分太多，容易招致衰弱。此時最好當發生花穗時，盡量疏去大部的花穗，使結少數的果即可。
(二)葡萄冬季剪定時，本年結果枝，不一定剪掉，因為今年的果枝，基部嫩芽到明年仍可發生結果枝而結果，但太多時或有優良的發育枝可剪掉。(葉克終)

水稻

缺肥水田葉變黃
施用粒肥最有效

【問】：(一)一期作臺南五號蓬萊稻齊穗



西德獅馬牌農藥

正光化工股份有限公司合作
包括正光公司部份產品



福利多乳劑

Ethyl Parathion 46.6% E.C.

二化螟、三化螟、
稻飛蝨、
蚜蟲類、青蟲類、

穗寶溶劑

Neo Asozin 6.5% S

紋枯病
晚腐病

所有農藥均有登記證

永松貿易股份有限公司

台北市松江路61號
電話：541144