



蔬 菜

哈密瓜可試種

【問】：(一)哈密瓜幾於臺中縣東勢是否適合，種子何處有售？(二)臺中東勢鎮與鹿港街十四號(黃天陽)【答】：(一)哈密瓜在本省目前尚在試驗階段，東勢附近是否適合該瓜栽培，因未經試驗無法確定，如需少量種子試種，可來函臺中區農業改良索取。(二)後復)

茭白筒分蘖宜多

青殼種成熟較早

【問】：(一)茭白筒分蘖以多深為最適宜？(二)茭白筒如何收穫，何品種成熟最早？(三)屏東新鄉鄉新埤村萬興路十八號(蔡水秀)【答】：(一)茭白筒經常保持五寸深度的水較適宜。(二)茭白筒的分蘖愈多愈好。(三)成熟後一百三十天左右就可開始採收。但採收最盛期，青殼種約在收穫後一百五十天，白殼種和紫殼種約在一百七十天。採收宜在傍晚或清晨，以草蓆充分肥水，莖片稍裂開，而看到少許嫩葉時為採收適期。(李樹泉)



稻 水

防水稻紋枯病

可用「阿蘇仁」

【問】：稻田噴撒阿蘇仁防治水稻紋枯病雖有見效，但噴過阿蘇仁的後期作水澆，根部都伸在田土表面，深根很少，且根為粗白，與未噴藥的稻田比較差得很多，如此怎麼辦？有無防治紋枯病而不傷害稻田土壤的藥劑？(南投縣埔里鎮水頭路二十六號之二黃新寬)【答】：「阿蘇仁」與多種同屬有機磷劑，為防治水稻紋枯病藥劑之一，目前推廣的均屬可濕性粉劑，每公頃每次用藥量為〇·四至〇·五公升，調配一千五百倍，原則上於分蘖盛期及孕穗期噴射防治。本劑調配濃度高時防病效果雖大，但易發生危險，唯一般藥害僅在噴藥後約發生。據調查有機磷劑撒布後的水稻吸鉀量顯著減少，稻田土壤缺鉀時藥害較大，因此必須注意施肥減少藥害。有機磷劑在土壤中和無殘留毒害，每分地施用多穗粉劑二十五公斤對水稻生育及結實是無影響。據稻根多分佈在土壤表層，且呈紅白，顯非藥害，若係阿蘇仁藥害亦應發生在土壤表層，稻根必不能分佈在表土，可能是新土層較淺，所施肥料均集中在表層土，因為稻根與其他作物一樣，有向化(肥)性，施肥較深，肥料分佈亦隨之較深，因此請試行深耕(較現行深度略深)，將肥料全層施肥，稻根可較易受延分佈。(蘇俊茂)

水稻臺南五號特性

【問】：(一)水稻臺南五號的特性如何？(二)其栽培管理要點如何？(三)二期作因夏雨傾盆，排水不良致病蟲猖獗，可有什麼更優品種，或改善辦法？(四)欲採正條密植以利產米，其行標距多少為宜？(雲林縣斗六鎮鎮北里九十二號之二黃錦雲)【答】：水稻臺南五號是豐產抗稻熱病強且碾米率高的品種，出穗後之生育後期莖葉枯萎較少，可維持後期植株青翠而提高產量。

農友隨身寶

綠油精

世界出名 蓬萊島
島上農友 不怕苦
每日增產 正認真
人人健康 真要緊

有時遇著 人艱苦
或者工作 操過勞
隨身帶有 綠油精
因為藥效 真好用
無論肚痛 或感冒
每人都有 隨身寶
家家備有 綠油精
蚊蟲病痛 無賴藥

寄來綠油精空盒10瓦一個
或5瓦四個或3瓦六個
免附郵票寄至台北
郵政信箱：〇九六
號，即奉贈種子
筆一支及精美
彩色月曆卡。

寄來空盒附郵
一元，即贈
高級手巾
一條及精
美彩色月曆
卡，多寄多送。



GREEN OIL
綠油精

可食可抹·氣味芬芳

包裝：1gm. 3gm. 5gm. 10gm

中國郵政特准掛號第五四一七號

實率，種子具休眠性所以收穫期遇陰雨天氣可減少穗上發芽之損失，穗粒數中等葉片狹尖，出穗後劍葉較垂下，耐肥性強。

〔施肥量〕每公頃施氮安五百至六百公斤，但宜斟酌稻田情形而加減其施肥量，並應早期施肥（一期作三十天、二期作二十天內施完追肥）以促進分蘗，增加單位面積穗數，然後施用穗肥以求穗大及增加良穀率。

病害防治：容易發生稻熱病的地區插秧後二十至三十天之分蘗初期，應特別注意葉稻熱病，如有發生應隨即防治。密植重肥栽培時，與其他品種一樣需注意防治紋枯病。適宜行株距。可採用每坪九十株左右（八寸×五寸或九寸×四·五寸）。

栽培時期：其插秧時期與其他葉稻相同，在臺南地區其適期，第一期作一月中旬至二月下旬，第二期作六月中旬至七月下旬。

生育日數：自插秧至成熟期，第一期作一十九天第二期作九五天，其他管理方法與一般籼米稻栽培法相同。

〔目前在臺南地區一般栽培之品種，以臺南五號抗稻熱病較強且成熟期穗發芽少，有關二期作下雨排水不良稻田，應疏通排水溝及雨後即將田水排乾以利恢復生育。〕

〔欲採正條密植以利蔬菜採作，可採用九寸×四、五寸為宜（如果在臺南地區可採用八寸×五寸為宜）。（莊南略）〕

木 耳

栽培木耳 切忌澆水過多

〔問〕：〔栽培木耳在何種環境生長最快？〕

〔答〕：〔栽培木耳的樹枝常有許多白色棉狀的雜菌，對木耳的產收影響很大，如何防治？〕

〔答〕：〔對木耳的水用井水還是用田水較好？〕

〔答〕：〔怎樣得知木耳生長的濕度，在何濕度下木耳生長最好？（新竹縣湖口村五十四號戴國晃）〕

〔答〕：〔在木耳栽培場地宜保持清潔及適當的通風，栽培木耳的樹木盡量勿使外皮受傷，在木耳生產時期栽培場地應保有八

十五%的濕度，切忌澆水過多。

〔來信僅說木耳發病的徵狀，並沒有將病害標本附上，故不敢確定其為何病。〕

〔澆井水較田水好，但須將井水抽出後經過適當時間使水溫升高與地上水溫相同時使用較好。〕

〔可用濕度計來測量濕度，濕度計可向儀器行購買，木耳生長的濕度在八十至八十五%之間最好。（胡開仁）〕

蜂 養

花粉缺乏期養蜂 用人工花粉代替

〔問〕：〔蜜蜂於蜜源缺乏之期，要怎樣配製人工花粉，其調製配方法如何？〕

〔答〕：〔蜜蜂採來的天然花粉，要加以保存，以備無花期用，此種天然花粉要怎樣貯藏？〕

〔在茶花盛開季節，蜜蜂往往採集茶花蜜而使蜂蛆中毒腐爛，連壯蜂也會漸漸減少滅亡，有何方法治療？以科學觀點，能否用化學元素反應來中和？〕

〔蜂羣在花期已達到飽和點，應如何調整蜂勢，才可以抑止分封熱？〕

〔在花期，蜂王忽然遺失，為了積極誘入處女王（此時有幼蟲），應如何誘入較為安全順利？（新竹縣關西鎮南山里三鄰十五號劉國榮）〕



〔答〕：〔在花粉缺乏之期，蜂羣食料無法維持時，飼給人工花粉，可用酵母粉、奶粉或豆粉供給，總比無花粉育蛆強。花粉為蜂羣主要食料，為保持新鮮蜜均應採隨用，故巢中不會貯藏多量花粉。如欲採收天然花粉，以備無花粉期補給飼餵，並不理想，應給人工花粉較為妥當。〕

〔一般蜂蛆腐爛係細菌性病害，但不能證明為茶花蜜中所引起。應將發病之巢箱巢底徹底消毒，嚴重時應從速焚燬。〕

〔應將強弱蜂羣巢箱互相調整，不但可避免分封，且能調整各蜂羣勢。如蜂羣特別旺盛，為抑制分封熱計，應使用繭箱及隔板，以增大巢箱中面積。〕

日本新奇交配種子。親身旅行帶回！

農生大型成功白菜 正白葉王牌，絕不黑甲、不易開花、葉先赤後黑、球圓美觀、45天三公斤。

農生60日甘藍 形質屬六〇甘藍，耐熱強性、美球白色、本種且較大型豐收為特長。

農生力士甘藍 形質屬初秋甘藍，美味幼嫩、球白美觀、本種且較耐腐爛為特長。

●很多其他瓜類、人參、卜卜新品種今後陸續公表請期待。

出 品：日本JVB A育種協會

總經銷：農生種子行貿易部

彰化市民族路一七八號

電話：三五九七轉 割機臺灣第30號

貴地種子行 均有經銷 請認明農生 目頭包裝

經濟部商品檢驗局檢驗合格

三 角 牌

保證 品質

綜 合 肥 料

農 作 物 的 大 補 品 !!!

粒 狀 肥 料 施 用 簡 便 久 持 效 肥 土 良 改

是 鈣、鎂、氮、磷、鉀、矽 的 綜 合 製 品

省 時！ 省 力！ 省 錢！

永 合 發 工 化 廠 出 品

臺 北 市 武 昌 街 一 段 六 十 巷 九 號

電 話：二 五 七 二、二 五 七 三、二 五 七 四

種 花

農林廳農肥字第〇〇四號登記

本刊讀者服務部代售日本進口花卉種子三十五種，每種每包五元，來信附郵票寄「臺北市郵政信箱二九號高小姐」。

種類：①春車菊。②忘勿草。③大輪コスモス。④おじぎ草。⑤西洋石竹。⑥スイートサルタン。⑦黃花昇藤。⑧傘映昇藤。⑨ベチニヤ。⑩洋種黃花金盞花。⑪大輪白花濱菊。⑫垣根用朝顏。⑬美女櫻。⑭千鳥草。⑮中輪パンジー。⑯西洋おだ巻。⑰花菱草。⑱大輪金魚草。⑲スイートピリス。⑳姫貝細工。㉑サルビヤ。㉒フロックス。㉓姫金魚草。㉔ゴテチャ。㉕カーネーション。㉖ロベリヤ。㉗河原撫子。㉘スーツク。㉙美女撫子。㉚帝王貝細工。㉛八重矢車草。㉜白花かすみ草。㉝梅撫子。㉞大輪ひな菊。㉟ポンポンアスタ！

豐年讀者服務部 啓

(四)使用蜂王籠介紹蜂王二日後誘入，必要時可噴烟更爲有效。(林珪瑞)


獸醫

羊經常下痢

多由寄生蟲引起

【問】：(一)羊經常下痢是何原因(尤其是在雨天)？
(二)羊在早上露水未乾前是否可放飼，下痢與吃濕的牧草是否有關？
(三)羊下痢除減食外是否有其他特效藥？
(四)羊的內服驅蟲藥何處有售，牛豬安是否有效？
(五)如種植牧草，每甲地可放牧幾頭羊？
(六)花蓮縣鳳林鎮南平十九號姜淑芬

【答】：(一)羊經常下痢的原因很多，尤其是線蟲性內寄生蟲寄生的爲害。
(二)羊在早上露水未乾前放牧，對羊致害最嚴重的爲各種線蟲(如捻轉胃蟲、腸結節蟲、柄線蟲及毛線蟲等)之仔蟲，均在牧草葉頂上潛伏待宿主來感染，故這時候放牧最危險。
(三)下痢與吃濕牧草之關係與第二項的理由相同，易感染寄生蟲而引起胃腸炎下痢等病。
(四)治羊下痢最重要的還是確定其病原，而根除其病原，同時注意第二項及第三項來預防寄生蟲之重覆感染，下痢嚴重時可利用對症療法，採用果膠白陶土(Kaopectin)十至二十西西(C)內服。飼養管理上少給水多分的青飼料爲妥。
(五)羊內寄生蟲目前使用硫二笨胺是最好的治療藥，有效率爲捻轉胃蟲八十至一〇〇%腸結節蟲七十五至一〇〇%，毛線蟲四十五至一〇〇%，用量爲〇.二至〇.五克(每公斤體重)用胃導管灌入或混於飼料餵與均可。德國製的(Citran)注射亦有特效，前者各大藥店均有售，後者可與臺北市中正路一七七九號中德貿易公司歐陽可佑先生連絡。牛豬安對羊之外寄生蟲有效，但對內寄生蟲(下痢症)效果並不太理想。



(四)種牧草一甲地可放幾頭羊，這個問題要看土質、灌溉、牧草之種類而異。同時冬季缺草時，是否有貯藏青飼料的設備等均有密切之關係。一般認爲山坡地可養二十至四十頭左右。(李永基)

花生

砂質壤土種花生
臺南選九號最好

【問】：(一)目前臺灣花生那一品種最好？而適於砂質壤土又是那一種？
(二)氮磷鉀的施用比率如何？追肥應如何施？
(三)單位面積產量多少？
(四)北港所發明的花生播種器之構造及形式如何？(花蓮縣秀林鄉崇德村六十八號廖隆補)

【答】：(一)目前臺灣(澎湖除外)花生栽培品種，春作以臺南選九號、臺南六號、臺南三號較好，秋作則以臺南選九號最好，上列品種均適合砂質壤土栽培。
(二)花生每公頃施用氮、磷、鉀的數量各爲十、六十、四十公斤，不過落花生適當施肥量要根據土壤的肥瘠而定。如用化學肥料硫酸銨、過磷酸鈣及氯化鉀時，可以均勻混合後施用。
(三)本省栽培花生以全部做基肥爲多，整地時撒施翻入土中或在播種前撒施然後開溝播種，一般很少施用追肥，而在花生初期生育不良時，始斟酌其發育情形施用少量氮肥，施追肥時在離花生植株十分處，開溝條施後覆土。
(四)本省花生單位面積產量，根據糧食統計要覽，民國五十五年爲每公頃產量一千一百七十三公斤。
(五)花生播種器可能是斗六鎮張金成先生製造而由北港鎮農會經銷者，其構造可分三部分：(1)漏斗形種子桶一個。(2)主動輪一對。(3)輸送帶一條上裝有種子勺。使用時將播種器固定在改良犁的犁身，犁開溝時則播種器的主動輪隨之轉動，帶動輸送帶，種子勺就裝種子(每勺一粒)，依一定距離落入種子溝內。(李根)

【問】：(一)羊經常下痢是何原因(尤其是在雨天)？
(二)羊在早上露水未乾前是否可放飼，下痢與吃濕的牧草是否有關？
(三)羊下痢除減食外是否有其他特效藥？
(四)羊的內服驅蟲藥何處有售，牛豬安是否有效？
(五)如種植牧草，每甲地可放牧幾頭羊？
(六)花蓮縣鳳林鎮南平十九號姜淑芬

【答】：(一)羊經常下痢的原因很多，尤其是線蟲性內寄生蟲寄生的爲害。
(二)羊在早上露水未乾前放牧，對羊致害最嚴重的爲各種線蟲(如捻轉胃蟲、腸結節蟲、柄線蟲及毛線蟲等)之仔蟲，均在牧草葉頂上潛伏待宿主來感染，故這時候放牧最危險。
(三)下痢與吃濕牧草之關係與第二項的理由相同，易感染寄生蟲而引起胃腸炎下痢等病。
(四)治羊下痢最重要的還是確定其病原，而根除其病原，同時注意第二項及第三項來預防寄生蟲之重覆感染，下痢嚴重時可利用對症療法，採用果膠白陶土(Kaopectin)十至二十西西(C)內服。飼養管理上少給水多分的青飼料爲妥。
(五)羊內寄生蟲目前使用硫二笨胺是最好的治療藥，有效率爲捻轉胃蟲八十至一〇〇%腸結節蟲七十五至一〇〇%，毛線蟲四十五至一〇〇%，用量爲〇.二至〇.五克(每公斤體重)用胃導管灌入或混於飼料餵與均可。德國製的(Citran)注射亦有特效，前者各大藥店均有售，後者可與臺北市中正路一七七九號中德貿易公司歐陽可佑先生連絡。牛豬安對羊之外寄生蟲有效，但對內寄生蟲(下痢症)效果並不太理想。

北市建藥字第168號

讓我們鄭重推荐今年度最新水稻殺蟲藥劑

子工ムサド



子工ムサド®

WP 50%

特滅蟲50%水和劑(TMC)

室町化成株式會社

台灣總代理

恒興源企業股份有限公司

台北市長安東路一段24號二樓 TEL. 546106

泡桐

杉木空地補植泡桐 生育良好收益高

【問】：(一)在魚池及關西等地過去種植杉木，近期中將皆伐，使萌芽更新，但杉木林內空地不少，是否可補植泡桐？
(二)在山坡地造林時，杉木和泡桐可否混合造林，每甲株數應如何配合？
(三)據有經驗的朋友說，泡桐雖然生長快收益高，但造林不容易成功，有沒人承包泡桐造林，種活後再由地主付款？(臺中市臺中路四一六號廖建祥)

【答】：(一)杉木萌芽更新林內空地補植泡桐，非常理想，蓋杉木能生長之地泡桐也可生育良好。杉木萌芽木生長甚速，補植杉木苗無法趕上，唯以補植生長快速的泡桐為最合適的措施。
(二)杉木與泡桐可混合造林，每甲株數以泡桐五百株，杉木二千五百株左右為宜。造林後八至十年時先砍伐泡桐，十五年生時皆伐杉木，收益當可較單純林高。

【問】：泡桐造林較一般樹種困難是事實，但如果苗根好，栽種時期對，則成活率可達七十至八十%。至以泡桐造林承包工作是值得提倡的制度，若干種苗業者有兼辦，詳情仍請與下列所介紹民間種苗商接洽。(林文鏡)

泡桐苗何處有售

【問】：貴刊十八卷十一期所刊載的泡桐苗，何處有售？(苗栗縣頭份鎮蟻里八鄰六十號林烈聰)

【答】：泡桐以分根繁殖造林，所需根苗在東部及中北部各縣政府多有發苗分配，但因數量有限，常無法滿足造林者之實際需要，造林者可向當地鄉鎮公所詢問及申請。除此以外，若干民間苗圃亦有出售泡桐根苗，茲介紹於下，需要者請直接連繫。
(1)桃園縣桃園鎮新生路六十二號宜農農產公司桃園苗圃。
(2)南投縣魚池鄉東池村文武巷二十一號西聯種苗行。
(3)花蓮市大同街三十六號花蓮種苗園。

保留地轉讓他人 雙方應履行契約

臺中縣東勢鎮豐勢路六十八號徐志元農友來信問：
(一)某甲將保留地耕作權，以五千元的代價讓渡某乙(有契約)，乙將荒地墾為梨園，現梨樹已長大了，某甲要將土地要回，這怎麼辦？
(二)某甲沒有通知某乙，就在此土地上種下杉苗是否有侵佔之嫌？
(三)某乙是否可以將杉木拔除？
(四)若某乙將土地歸還與某甲，可否向某甲要求賠償。

警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：(一)甲既將保留地轉讓於乙，兩方訂有轉讓契約，事實已存在，那麼甲就不能向乙要回土地。(二)甲沒有通知乙而擅自種下杉苗，是犯侵佔罪。(三)乙可以通知甲，要甲把杉苗拔除。(四)甲既將土地轉讓於乙，乙可以歸還土地，如果乙自己願意把土地歸還於甲，自然可以，乙可以向甲要求賠償梨苗和一切管理費用，及五千元，若甲不歸還不給予賠款，當然乙就可以不把土地歸還給甲。

貧苦役男安家費 按甲乙兩級支給

臺東縣卑南鄉初鹿村八十五號黎偉雄農友來信問：我是一個養子民國三十八年生，沒有兄弟姊妹，雙親均已五十餘歲，是否可以減役或申請家眷補助費，其申請辦法如何？
警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：(一)甲既將保留地轉讓於乙，兩方訂有轉讓契約，事實已存在，那麼甲就不能向乙要回土地。(二)甲沒有通知乙而擅自種下杉苗，是犯侵佔罪。(三)乙可以通知甲，要甲把杉苗拔除。(四)甲既將土地轉讓於乙，乙可以歸還土地，如果乙自己願意把土地歸還於甲，自然可以，乙可以向甲要求賠償梨苗和一切管理費用，及五千元，若甲不歸還不給予賠款，當然乙就可以不把土地歸還給甲。

豬 養

二代頂雙溪種母豬 可與藍瑞斯等配種

【問】：(一)二代雙溪種母豬配何種公豬，生產仔豬發育較好？
(二)桃園一代母豬配藍瑞斯公豬所生的仔豬有何優點及缺點？
(三)製造青貯料用木瓜與木瓜葉混合米糠百分之二十，或玉米粉百分之二十，兩者何種較好，青貯後多久可以喂豬？
(四)青貯料用完後，以何種藥物消毒為宜？
(五)花生殼粉餵豬會影響發育發育否？
(六)南投國姓鄉黃添發、臺南縣林安村張聰惠)



【答】：(一)頂雙溪種母豬為臺灣本地豬種之一，可與外國優良品種公豬交配以改良其屬體品質增加瘦肉及生長速率，公豬如藍瑞斯，大白約克夏等品種均可。若自然交配不便，可行人工授精。
(二)可改良其屬體品質增加瘦肉生長量，唯需要較好的完全飼料供應，始可達到其增進生長速率，提高飼料利用效率，減少因營養不良所引起的疾病。
(三)製造青貯料是收穫某一作物(新鮮物)數量甚多，一時無法供飼家畜，必須有一段時間貯存以備較長時間慢慢使用，所採用的方法，木瓜葉或菜之適宜調劑水份含量均高，添加米糠或玉米粉適宜進行酸性醱酵，故此二種添加物並無差別，唯添加米糠百分之二十比添加玉米粉百分之十者，粗蛋白質含量較高而已。
(四)可以石灰粉全面撒布消毒。
(五)花生殼粉經炒後，供很快出售之豬，若用量極為少量三%以下與其他品質良好的飼料混合後使用，即因此而增加一些粗纖維含量，可以減少豬隻背脂厚度增加瘦肉，通常採用花生殼粉餵豬雖用量少，但其有效營養成分含量甚低，豬隻生長較慢。(葉澤波)

開墾地影響鄰田 如有損害應予賠償

雲林縣林苑鄉與貴村庄仔路四號林朝東農友來信問：甲田與乙田相鄰，乙田比甲田高出六尺，在二田間本有一傾斜坡壁。現某乙將此坡地耕作，大雨時致使新耕地土壤崩塌埋沒甲田裏將成熟的稻子，某甲可向某乙提出賠償否？
警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：甲田與乙田相連接，乙田比甲田高六尺，並有三尺左右的斜坡。乙將該斜坡耕作，致使大雨將新耕之土地全部沖蝕崩塌落在甲田之內，而使甲田內成熟之稻谷受到損害，甲可問乙請求損害賠償。

問題

解答

法

律

警察廣播電臺提供

警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：(一)甲既將保留地轉讓於乙，兩方訂有轉讓契約，事實已存在，那麼甲就不能向乙要回土地。(二)甲沒有通知乙而擅自種下杉苗，是犯侵佔罪。(三)乙可以通知甲，要甲把杉苗拔除。(四)甲既將土地轉讓於乙，乙可以歸還土地，如果乙自己願意把土地歸還於甲，自然可以，乙可以向甲要求賠償梨苗和一切管理費用，及五千元，若甲不歸還不給予賠款，當然乙就可以不把土地歸還給甲。

警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：(一)甲既將保留地轉讓於乙，兩方訂有轉讓契約，事實已存在，那麼甲就不能向乙要回土地。(二)甲沒有通知乙而擅自種下杉苗，是犯侵佔罪。(三)乙可以通知甲，要甲把杉苗拔除。(四)甲既將土地轉讓於乙，乙可以歸還土地，如果乙自己願意把土地歸還於甲，自然可以，乙可以向甲要求賠償梨苗和一切管理費用，及五千元，若甲不歸還不給予賠款，當然乙就可以不把土地歸還給甲。

警察廣播電臺法律顧問王希平律師答復說：(一)甲既將保留地轉讓於乙，兩方訂有轉讓契約，事實已存在，那麼甲就不能向乙要回土地。(二)甲沒有通知乙而擅自種下杉苗，是犯侵佔罪。(三)乙可以通知甲，要甲把杉苗拔除。(四)甲既將土地轉讓於乙，乙可以歸還土地，如果乙自己願意把土地歸還於甲，自然可以，乙可以向甲要求賠償梨苗和一切管理費用，及五千元，若甲不歸還不給予賠款，當然乙就可以不把土地歸還給甲。