



蔬 菜

哈密瓜可試種

【問】：(一)哈密瓜幾於臺中縣東勢是否適合，種子何處有售？(二)臺中東勢鎮與鹿港街十四號黃天陽

【答】：(一)哈密瓜在本省目前尚在試驗階段，東勢附近是否適合該瓜栽培，因未經試驗無法確定，如需少量種子試種，可來函臺中區農業改良索取。(丁俊傑)

茭白筒分蘖宜多

青殼種成熟較早

【問】：(一)茭白筒深水以多深為最適宜？(二)茭白筒如何收穫，何品種成熟最早？(屏東新鄉鄉新埤村黃興路十八號蔡水秀)

【答】：(一)茭白筒經常保持五寸深度的水較適宜。(二)茭白筒的分蘖愈多愈好。



【問】：(一)青殼種後一百三十天左右就可開始採收，但採收最盛期，青殼種約在收穫後一百五十天，白殼種和紫殼種約在一百七十天。採收宜在傍晚或清晨，以草蓆充分肥水，莖片稍裂開，而看到少許嫩葉時為採收適期。(李樹泉)

稻 水

防水稻紋枯病

可用「阿蘇仁」

【問】：稻田噴撒阿蘇仁防治水稻紋枯病雖有見效，但噴過阿蘇仁的後期作水澆，根部都伸在田土表面，深根很少，且根為粗白，與未噴藥的稻田比較差得很多，如此怎麼辦？有無防治紋枯病而不傷害稻田土壤的藥劑？(南投縣埔里鎮水頭路二十六號之二黃新寬)

【答】：「阿蘇仁」與多種同屬有機磷劑，為防治水稻紋枯病藥劑之一，目前推廣的均屬可濕性粉劑，每公頃每次用藥量為〇·四至〇·五公升，調配一千五百倍，原則上於分蘖盛期及孕穗期噴射防治。

本劑調配濃度高時防病效果雖大，但易發生危險，唯一般藥害僅在噴藥後約發生。據調查有機磷劑撒布後的水稻吸鉀量顯著減少，稻田土壤缺鉀時藥害較大，因此必須注意施肥減少藥害。有機磷劑在土壤中和無殘留毒害，每分地施用多穗粉劑二十五公斤對水稻生育及結實是無影響。據稻根多分佈在土壤表層，且呈紅白，顯非藥害，若係阿蘇仁藥害亦應發生在土壤表層，稻根必不能分佈在表土，可能是新土層較淺，所施肥料均集中在表層土，因為稻根與其他作物一樣，有向化(肥)性，施肥較深，肥料分佈亦隨之較深，因此請試行深耕(較現行深度略深)，將肥料全層施肥，稻根可較易受延分佈。(蘇俊茂)

水稻臺南五號特性

【問】：(一)水稻臺南五號的特性如何？(二)其栽培管理要點如何？(三)二期作因夏雨傾盆，排水不良致病蟲害，可有什麼更優品種，或改善辦法？(四)欲採正條密植以利產米，其行標距多少為宜？(雲林縣斗六鎮鎮北里九十二號之二黃錦雲)

【答】：(一)水稻臺南五號是豐產抗稻熱病強且碾米率高的品種，出穗後之生育後期莖葉枯萎較少，可維持後期植株營養而提高穗

農友隨身寶

綠油精

世界出名 蓬萊島
島上農友 不怕苦
每日增產 正認真
人人健康 真要緊

有時遇著 人艱苦

或者工作 操過勞

隨身帶有 綠油精

因為藥效 真好用

無論肚痛 或感冒

每人都有 隨身寶

家家備有 綠油精

蚊蟲病痛 無賴藥

寄來綠油精空盒10瓦一個

或5瓦四個或3瓦六個

，免附郵票寄至台北

郵政信箱：〇九六

號，即奉贈種子

筆一支及精美

彩色月曆卡。

寄來空盒附郵

一元，即贈

高級手巾

一條及精

美彩色月曆

卡，多寄多送。

綠油精

GREEN OIL



可食可抹·氣味芬芳

包裝：1gm. 3gm. 5gm. 10gm

中國郵政特准掛號第五四一七號

