

(四)使用蜂王籠介紹蜂王二日後誘入，必要時可噴烟更爲有效。(林珪瑞)

獸醫

羊經常下痢

多由寄生蟲引起

【問】：(一)羊經常下痢是何原因(尤其是在雨天)？(二)羊在早上露水未乾前是否可放飼，下痢與吃濕的牧草是否有關？(三)羊下痢除減食外是否有其他特效藥？(四)羊的內服驅蟲藥何處有售，牛豬安是否有效？

(五)如種植牧草，每甲地可放牧幾頭羊？(花蓮縣鳳林鎮南平十九號姜淑芬)


【答】：(一)羊經常下痢的原因很多，尤其是線蟲性內寄生蟲寄生的爲害。

(二)羊在早上露水未乾前放牧，對羊致害最嚴重的爲各種線蟲(如捻轉胃蟲、腸結節蟲、柄線蟲及毛線蟲等)之仔蟲，均在牧草葉頂上潛伏待宿主來感染，故這時候放牧最危險。

(三)下痢與吃濕牧草之關係與第二項的理由相同，易感染寄生蟲而引起胃腸炎下痢等病。

(四)治羊下痢最重要的還是確定其病原，而根除其病原，同時注意第二項及第三項來預防寄生蟲之重覆感染，下痢嚴重時可利用對症療法，採用果膠白陶土(Kaopectin)十至二十西西(C)內服。飼養管理上少給水多分的青飼料爲妥。

羊內寄生蟲目前使用硫二笨胺是最好的治療藥，有效率爲捻轉胃蟲八十至一〇〇%腸結節蟲七十五至一〇〇%，毛線蟲四十五至一〇〇%，用量爲〇.二至〇.五克(每公斤體重)用胃管灌入或混於飼料餵與均可。德國製的(Citran)注射亦有特效，前者各大藥店均有售，後者可與臺北市中正路一七七九號中德貿易公司歐陽可佑先生連絡。牛豬安對羊之外寄生蟲有效，但對內寄生蟲(下痢症)效果並不太理想。



(四)種牧草一甲地可放幾頭羊，這個問題要看土質、灌溉、牧草之種類而異。同時冬季缺草時，是否有貯藏青飼料的設備等均有密切之關係。一般認爲山坡地可養二十至四十頭左右。(李永基)

砂質壤土種花生

臺南選九號最好

【問】：(一)目前臺灣花生那一種品種最好？而適於砂質壤土又是那一種？(二)氮磷鉀的施用比率如何？追肥應如何施？

(三)單位面積產量多少？(四)北港所發明的花生播種器之構造及形式如何？(花蓮縣秀林鄉崇德村六十八號廖隆補)

【答】：(一)目前臺灣(澎湖除外)花生栽培品種，春作以臺南選九號、臺南六號、臺南三號較好，秋作則以臺南選九號最好，上列品種均適合砂質壤土栽培。

(二)花生每公頃施用氮、磷、鉀的數量各爲十、六十、四十公斤，不過落花生適當施肥量要根據土壤的肥瘠而定。如用化學肥料硫酸銨、過磷酸鈣及氯化鉀時，可以均勻混合後施用。

本省栽培花生以全部做基肥爲多，整地時撒施翻入土中或在播種前撒施然後開溝播種，一般很少施用追肥，而在花生初期生育不良時，始斟酌其發育情形施用少量氮肥，施追肥時在離花生植株十分處，開溝條施後覆土。

(三)本省花生單位面積產量，根據糧食統計要覽，民國五十五年爲每公頃產量一千一百七十三公斤。

(四)花生播種器可能是斗六鎮張金成先生製造而由北港鎮農會經銷者，其構造可分三部分：(1)漏斗形種子桶一個。(2)主動輪一對。(3)輸送帶一條上裝有種子勺。

使用時將播種器固定在改良犁的犁身，犁開溝時則播種器的主動輪隨之轉動，帶動輸送帶，種子勺就裝種子(每勺一粒)，依一定距離落入種子溝內。(李根)

北市建藥字第168號

讓我們鄭重推荐今年度最新水稻殺蟲藥劑

子工ムサド



子工ムサド®

WP 50%

特滅蟲50%水和劑(TMC)

室町化成株式會社

台灣總代理

恒興源企業股份有限公司

台北市長安東路一段24號二樓 TEL. 546106