




姿態和行動

般皆看外型來選擇

怎樣選擇種火雞

簡明龍

春天留種的火雞到日前已長大了。在一羣火雞中，有的生長健壯，有的差一點。體型健壯，發育良好的火雞即可留為種用。畸形及生長較差的火雞則應適時淘汰出售。

十、十一月間是選擇、淘汰火雞的時期。被淘汰的火雞經過一、二個月的肥育，即可趕上聖誕節。已產過蛋的火雞，現在已離休產，如已產過二季蛋的火雞，應全部肥育出售，若只產過一季蛋的火雞，應全部淘汰，但因目前本省火雞雜價好，生產能力較好的火雞尚有留種的價值，但生產力低，活力減退或受傷的火雞，則應在此時淘汰，肥育後出售。

選擇火雞時，除非有生產記錄外，一般皆看外型來選擇。

姿態和行動：（尤其在選擇雄火雞時應注意）：火雞站立時，身體要很平穩，由肩部至尾部自然傾斜，其傾斜度，約為三十五度至四十五度，若有肩部及尾部下斜而背部凸起者，應淘汰。

火雞走動時頭頸靈活敏捷，步伐要自然穩健，若有行動時，跛行、步伐搖擺、蹣跚者，要淘汰。

頭頸部：

火雞頭部要有一對圓而明亮的眼睛，若有瞎眼、眼睛無神或因眼睛不好吃料及行動不便者，皆需去除。

火雞的嘴要短且稍具彎曲，若有歪嘴或過長應淘汰。頭宜深寬，長短適中，頸要直，長短與頭配得很均稱。

胸部：胸要寬廣，整個胸部平面約與背部平行，測定時可用雙手，一手按住背部，另一手按住胸部，則可看出雙手掌平行與否，若兩手指相接近，或兩掌眼相接近，則表示胸部與背部不平行。

龍骨要直，長短適中，無節結突起，若龍骨過短彎曲，或有節結突起時，會影響體型及交配，宜

淘汰。

背部：要寬平，若有拱背、彎曲或皮膚撕裂者，應淘汰。

腳與腿：腿部要健壯且附豐滿的肌肉，腿部長短要適中，堅強及硬直，若有彎曲腫脹者應除去。

體重：體重按雄雌及種類各有差別，體重過輕者不留為種用，一般大型火雞如廣胸青銅色大型火雞，在二十六週齡時雄者十二公斤，雌者七公斤半。在二十八週齡時，雄者十三公斤，雌者七、七公斤。小型火雞如貝茨維爾小型火雞，在二十六週齡時，雄者七公斤半，雌的四公斤半。在廿八週齡時雄雞八公斤，雌雞四、七公斤。

各品種應具各品種的特徵，若沒有品種特徵者，則為失格而應淘汰。

梨樹施肥

一、李信芳：梨樹施肥每年二至三次，第一次在早春新根未發育前，第二次應在五、六月間施用，在果樹生長及果實肥大時，施速效性化學及液體肥料。

氮肥：硫酸銨、尿素。磷肥：過磷酸石灰。鉀肥：硫酸鉀、草木灰。有機肥：大豆餅、菜子餅、花生餅、人糞尿、廐肥、雞糞等。氮磷鉀比例約三比二比一。

至一尺以上。

(2) 檢查土壤，是否有地下害蟲，如有害蟲，以不連作為宜。

(3) 前紅甘蔗如有病害，應把枯葉燒除，如無病葉可犁入土中。

(4) 整地時，每公頃應施一% B H C 粉劑九十公斤。

(5) 整地時，每公頃應加施廐、堆肥三萬公斤以上。

紅甘蔗施肥連作要點

農民喜用人糞原因：(1) 人糞尿豬糞尿均為自給肥料，不必化錢購買。(2) 這二種肥料均屬速效之氮肥，施用後肥效明顯。另有人認為施用這二種肥料可使紅甘蔗組織較軟，品質好，其實是多施氮肥的效果。

人糞尿豬糞尿均屬有機肥料，其中含有少量氮磷鉀以外的成份，此為化學肥料所無者。(建)

(註：嘉義市郵政信箱第六十一號崑崙農友來信詢問有關紅甘蔗問題請參看本文)