(一)番石榴在何時接穗最好，接穗要如何選擇？(葉園大溪一心里六十九號王希堯)

【答】：(一)番石榴因生長迅速結果很早，應用方面素不採用高接，又番石榴經濟壽命短暫，亦不適用高接，仍以適時更新為妥。

(二)番石榴因樹液充足，嫁接後容易引起腐爛，成活率甚低。番石榴接穗之老嫩與成活關係甚大。頂端呈方形部份，皮薄過嫩，不可用作接穗。以綠色與褐色之間的部位最適宜。未剪下前，最好將方形部先行剪除，繼在適合作接穗部位，將葉片剪除，待葉柄脫落，芽體肥大時(約一星期)剪下嫁接，成活較易。(張振苗)

防果園香附子草可試用塑膠布

【問】：(一)果樹園裏長了很多土香草(什草)有何藥品可防除？

(二)荔枝苗購買至種植(約經二天)成活率很差，其原因何在？

(三)雞糞(未經發酵)可直接施於柳丁果樹否？(嘉義縣朴子鎮竹村里五十八號張必儲)

【答】：(一)土香草即香附子草，為不地果園最常見之雜草，其地上部用殺草劑噴撒，可以使之枯黃，但地下部之球莖則不能殺除，此草忌水在水田少見，但果園不能長期浸水，肥沃園地發生尤多，防除法，可試用新興之PE塑膠布，選用稍厚而黑色者，於普通除草後鋪於土面，可阻止其發生，並兼有防旱保溫保肥……等優點，但是否經濟合算，則須研究計算。

(二)購入之荔枝苗種植後成活率低，恐係種苗剪下後未經一段時期假植之故，一般以高壓法(空中壓條)繁殖之苗木，剪下後必須置陰處假植一段時間(半年至一年)，使根羣發育良好，後再行定植，方易成活，故買苗時，應注意其假植時間，對於根部之發育狀態尤宜注意，種植荔枝最好於苗木購入後，先選陰蔽而肥沃之地，將其假植半年藉此時間將定植地及植穴充分整備，然後定植為適。

(三)新鮮雞糞須堆置發酵後使用，則肥效速而又無肥害，木本果樹(如柳橙)雖較一般草本性蔬菜花卉抵抗力為強，但為增進肥效減少流失，仍以先行發酵處理，不直接施用為宜。(黃鋤臣)

紅肉李高接法

【問】：(一)本省大紅肉李之高接，可用那些果樹品種？

(二)大紅肉李有那些品種？

(三)高接苗木接在何處較良好，其方法如何？

(四)高接宜於何月行之，接苗枝條是否全枝？(嘉義太保鄉前潭村七十九號)

【答】：(一)李樹一般用桃、梅、李等做砧木都可以，你若認為大紅肉李不好，也可以將大紅肉李改接其他品種，每株樹上可以高接許多不同品種，同一個果園內應該栽培二、三種以上品種，纔能促進授粉結果。

(二)大紅肉李、就是李樹中的一個品種，故大紅肉李沒有其他品種可分，但紅肉李中除大紅肉李之外，尚有花螺李、二紅肉李、紅肉內李、六月黑李等紅肉李。

(三)高接普通可以接在主幹上或主枝上，方法用劈接法或切接法如附圖。

切接法



劈接法



(四)高接法適於一至二月間行使，接苗枝條(接穗)帶有芽就可以，不必用整根枝條。(李信芳)

養雞

卵肉兼用紐漢西

【問】：(一)卵肉兼用雞何品種比較普遍而有經濟價值，何處有此雞出售，價錢若干？

(二)飼養白蘆花雞是否有利，純種雞何處有售？(苗栗縣公館鄉石墻村六十四號鍾有亮)

【答】：(一)卵肉兼用種比較普遍而有經

品質創造信譽・信譽保證品質
燕子牌農藥
產品項目
BHC粉劑
BHC粒劑
BHC可濕性粉
西樂生石灰
西馬賽可濕性粉
DDVP乳劑
馬拉松乳劑
靈丹乳劑
益普殺乳劑
大滅多乳劑
好滅蝨乳劑
效速靈乳劑
殺敵青乳劑
特農松乳劑
巴拉松乳劑
順米農乳劑
新掃滅紋液劑
DDT乳劑
所有產品均有登記證
順益化學股份有限公司
臺中縣清水鎮鎮南街一號　電話：45・341號

為害水稻的
浮塵子.飛蝨
請趕快使用速效性、效果大
正豐牌 永利農乳劑
正寶殺乳劑
品質正確　效果優良
正豐化學股份有限公司
霧峯：電話63