

濟價值者為紐漢西及橫斑斑花雞，唯橫斑斑花雞羽毛長得比較慢，所以利用做為種雞生產金用肉雞時，大部份農友都喜歡用紐漢西。紐漢西與橫斑斑花雞產卵都不錯可以當種用。紐漢西及橫斑斑花雞臺灣省畜產試驗所現在推廣，每隻六元。

(二)飼養白蘆花要有高度的飼養技術，才能賺錢，因為白蘆花飼養管理不當，雞隻不生蛋，死亡率也高。目前大鵝場都直向外國進口，偶爾也有分讓給小鵝場，價錢相當貴，臺灣省畜產試驗所育成有優良純種白蘆花，初生雞無雜別者每隻十二元。(趙傳秋)



肥料

品種較好？

(問)：(一)本地是黑粘土，堆排水良好，冬季欲栽培柑仔甘諸以何品種較好？(二)什麼是有機肥，功用如何？(三)新竹縣湖口鄉湖口村五十八號(戴天浩)

(答)：(一)新竹地區冬季柑仔甘諸品種以「新竹一號」較好，請向新竹市清雅街九號，新竹區農業改良場接洽可獲得少許諸苗試種。(二)有機質肥料，就是用農作物殘渣等做成的肥料稱為有機質肥料，其代表者為堆肥，利用稻草，雜草加入糞或豬糞做成，其他如人糞尿、豬糞尿、雞糞、也均是有機質肥料。堆肥對農作物所需養分，效果較慢，普通在農作物種植前施於田間做為基肥，在作物生育期間，可供作物吸收利用。氮可促進農作物莖葉生長，磷可幫助農作物開花結實，如大豆、花生需磷較多，鉀可使農作物根部肥大如甘藷、蘿蔔、木薯、需鉀較多。(簡金寬)

蚵仔殼作肥料

需先粉碎後施用

(問)：(一)一般農村牛糞及稻草混合造成的堆肥有機質，是否可以混合石灰。混合石灰後，是否會把氮肥排洩？(二)海蚵殼含有那些肥分，如氮、磷、鉀、鈣等？(東勢鎮隆興石麻巷十四號劉炳昆)

(答)：(一)牛糞與稻草混合製造堆肥，不需要滲入石灰，混合石灰可能造成氮素的損失。(二)海蚵殼(螺殼)含有少量的磷、鉀、和大量的鈣，如要作肥料應磨成細粉，否則肥效不大。(王君穆)

農藥

防農藥蓄積性中毒
平時工作需謹慎

(問)：如何防治蓄積性慢性農藥中毒，中毒後多久會發生何病狀？(嘉義縣水上鄉水上村七五號)

(答)：具有積存性而能引起慢性中毒的農藥，如安特福等。不論由何器官進入人體體內都先被體內脂肪吸收，再慢慢侵入小腦脊髓，肝腎致神經被害，引起神經刺激特別知覺、聽覺過敏、症狀如惡心、不思飲食、痙攣發抖、暈眩、手足麻痺、嘔吐腹瀉、重者昏迷不醒、呼吸困難、心臟麻痺而死。故中毒往往慢性的，又因其延遲性強，能造成重要器官組織的毀壞，以致挽救不及而死，此種中毒一般無預告性，必須謹慎防範，目前無解毒劑可用，祇有用一般救護方法。(洪維懷)

雜草

茶園生雜草——
可用卡滅克斯防除

(問)：(一)近來工資很貴往往利不及本，斜坡地茶園有小型剪草機否，價格若干？(二)坡地茶園有無小型拔草機？(三)茶園方面可用何種除草劑，二、四、D是否可用？(桃園縣龍潭鄉二水村五號鍾顯貴)

(答)：(一)斜坡茶園與平地茶園之採摘，所使的手剪或背囊式動力採茶機並無不同處，小型動力採茶機目前本省尚無製造，但茶業改良場已由日本內出、富士等公司引進試驗過，價格每臺在日本成交約在新臺幣六千元左右。(二)斜坡茶園因坡度有大小之別，坡度大者使用機械除草較為困難，目前尚無適當小



BASF

西德獅馬牌農藥

正光化工股份有限公司合作
包括正光公司部份產品

福利多乳劑

Ethyl Parathion 46.6% E.C.

三化螟、
二化螟、
稻飛虱、
青蟲類、
蚜蟲類、

穗寶溶劑

Neo Asozin 6.5% S

紋枯病
晚腐病

所有農藥均有登記證

永松貿易股份有限公司

台北市松江路61號

電話：541144