




(攝德坤林) 業作機潤姜母觀員人術技業茶

自然萎凋 (CKK)	萎凋機	茶區	
		頭屋茶區	魚池茶區
七一·六七二·六七四·二七七·五	七二·〇七三·六七四·一七九·三	包種茶	青心大冇
		烏龍茶	阿薩姆
		紅茶	
		紅茶	

由上表可見萎凋機製成的茶葉，對品質不但沒有影響，而且比自然萎凋者為高。尤其雨季或多雨的茶區，使用萎凋機的茶葉品質更為優良。何況在雨天根本無法進行自然萎凋或日光萎凋的情形下，這種送風式茶葉萎凋機的出現，自有特殊的意義和貢獻！



紅 蟳

賴 永 順

在本省一般俗稱「蟳仔」的水族就是蟹的品種，蟹的種類很多，本省常見可食的蟹有六種：
 (一) 蟳 (俗稱紅蟳)：體色灰綠，普通市面出售的，體寬約廿公分。產於羅東、蘇澳、基隆、新竹、臺南、東港等地方。產期週年性，十二月至隔年三月間最盛。美味，雌的在產卵前價錢最貴。

(二) 蟳仔：雄的有美麗的碧青色淡浪花樣，雌的呈橄欖色，產於臺灣沿海。週年性，美味。

(三) 蟳：體色以綠色為主，雄的青色較濃，雌的黃褐色帶紫紅色。產於臺灣沿海，美味。

(四) 三點仔：殼上有三個紅圈，產於臺灣沿海。週年性，美味。

(五) 十字蟹：體色黃色雜有若干紅色縱紋，產於基隆、安平、東港等地。

東、福隆、新店、大甲、員林、臺南等地。產期為八月、十一月、一月最盛。此蟹是肺蛭的中間寄主，吃的時候要小心，應該充分煮熟。

蟳喜棲息於沙泥底，善游泳，移動能力很大。白天潛伏在沙泥中，黃昏後至半夜開始索餌行動。餌料是小螺、貝類、多毛蟲類、小甲殼蟲等底棲小動物。

冬天移動至較深區域或外海，春夏季移到較淺海域或內灣。水溫降至攝氏十五度，則開始潛伏在沙泥內冬眠。冬眠前(秋末)雖在攝氏十五度前後仍略有攝餌行動，但春天非到十七度以上，索餌行動都不活躍。攝餌和脫殼成長良好溫度為攝氏二十度以上。

繁殖池應設在海水滲透性良好的沙灘。蟳仔是底棲動物，應特別注意底質惡化的預防，否則很難成功。底質應選用無保水性柔軟的細砂，池底底沙的厚度六至十公分。

水雖無須太深，但為適應水溫、鹽分和其他的急變，最低限度也要三十公分，並保持濕

潮時仍有適量的水。

飼育密度以蟳仔可潛伏的沙底面積為準，普通的每平方公尺十個左右，較大的約五個以內比較安全。

餌料可使用貝類、雜蝦、魚肉等。貝類無須細切，只要把殼打有裂痕就好。餌料重量為所放養的蟳仔總重的二成。在黃昏前投餌，隔天早上須將殘餌清除。飼育密度過高，會引起自相殘食，脫殼後的甲殼是軟的，容易受害，為防止這種損失，應設法使軟殼期間縮短和使蟳仔容易潛伏沙裏，因此應充分給餌和保持水質、底質要在良好狀態。短期間若養可將殼的可動指切除或以橡皮筋將夾子縛起來，則可預防自相殘食。

冬眠中不會脫殼成長，雌蟹在交配後至卵孵化期間也不脫殼成長。