

農友經驗



復。行距三十五公分，深一英寸半。

播種分行撒及叢播。

穴距二十五公分，兩者用

手耙或腳蓋平均可以。

(2) 間拔與除草。

間拔：在子葉展開後每叢選子葉正心臟形且彈狀健全束留四棵，此爲第一次間拔。

在第二營養葉長出後，選留一株發育良好的。行撒者株距亦爲二十五公分。注意別留得太密而碍生長。

除草：在第一次與第二次間拔時除一次，第二次在第一次除草後一星期內進行，並順予掘鬆表土。注意除草時遇雨則重行一次除草。

(3) 施肥與病蟲害防治

施肥：在本葉三四片時施追肥一次，用尿素泡水三百五十倍左右，

灌施整株，一分地約一包。第二次爲

在第一次施後十二天，同樣用尿素泡水，方法一樣。但若葉子於第一次施後一直呈深綠色，則二次追肥可免或稍晚。據經驗，施尿素比用硫酸銨泡水效果好。

(4) 病蟲害防治。

菜蚜蟲害有：(1) 菜心蚜，爲

害菜葉生長點(菜心)，可用二十五

% DDT 乳劑加水五百倍或十% BH

C 乳劑加水一千倍防治。

(2) 菜螟蛾及黃條葉蛾，菜螟

蛾食葉部，黃條葉蛾食根而引起軟腐病、黑腐病。防治方法和菜

心腐病。

(3) 蚜蟲，使葉呈黃色斑紋而

萎縮，可用五十% 馬拉松乳劑加水五

百至八百倍或三十五% 魚藤精乳劑加

水二百五十至五百倍噴射。若和上述

方法合用，效果更佳。

(4) 據邱明洲會友報告，二分地除去費用可收純益四萬餘元，而且外銷流球

二種同時發生，將此兩種藥劑之一混合二十五% DDT 乳劑防治。防治期間爲第一次除草前一次，十天後再一次，以後酌情情形噴洒。注意收穫前七天停止噴藥。

(5) 種後三十天可間作甘薯，對蘿蔔沒影響。

(6) 其他管理上注意事項

(1) 種子消毒用福爾馬林二百

倍液或水銀製劑八百倍液浸二十分鐘。若八月上旬播種，須鋪蓋稻草以防幼株被炎陽燙死，並可防陣雨沖刷，如在八月下旬播種者則可免鋪稻草。

(2) 第一次間拔立即填種死穴，並且於颱風過後注意排水、蟲害及鬆鬆表土。

(3) 下種後幾天，如發現臺灣大蟋蟀，即用甘薯葉沾 BHC 粉劑，掘找洞口予以塞入而觸殺。

(4) 收穫前四天灌水，以防糠

心並增加收穫，收穫適期要控制好，最好視價格而好好控制。

(5) 種後三十天可間作甘薯，對蘿蔔沒影響。

(6) 當耕種期最好是八月上旬，整地後立即翻耕入土，以防雨水冲蝕。

(7) 翻耕次數愈多愈好，因爲土層愈鬆，根易深入而肥大，叢播比行播好，在出芽間拔留株均較爲可靠。

(8) 收穫時如有軟腐病及黑腐病株，集中焚毀，勿拋棄於菜園，並用二十倍福爾馬林消毒跡地。(雲林縣大埤鄉泊雁岸十八號徐江河)

西洋芹菜的栽培

彰化縣埔心鄉張仁川

這次埔心鄉四健會參加彰化全縣農業推廣教育十週年紀念，以「西洋芹菜的栽培」獲得教育展示項目中最高的評價。我特別將它有關栽培經過的資料抄錄，以供同好們參考，並歡迎實地觀摩指教：

(1) 此次栽植西洋芹菜採用 F M I D 五品種，性喜低溫、多濕、背風向陽之地，以溫度攝氏十五至二十二度爲宜，土質以腐殖土或砂壤土較佳。種子來源由農會供應。育苗期因發芽慢，要達二月之久，平常在九月下旬深耕鬆軟土地準備播種，其植株行距約四×四或五×五公分爲宜。

(2) 本圃整理用農耕機碎土，培土作畦，同時作基施工作。在十一月間植苗，行距四十公分，株距十五公分左右。施肥忌用糞尿，堆肥以豆粕、硫酸胺、過石、氯化鉀相配合，共施基肥一次，追肥三次，時間在定植後二月內。

(3) 中耕宜在施肥噴藥前施行。病蟲害防治用大必隆乳劑一千倍液，每隔二星期噴一次。如有白粉病、露菌病發生，用錳、鋅乃蒲四百倍液，每星期噴一次即可。最從三至四個月內，應該注意收穫十五天前，以厚草袋或草席的軟化

土壤，基肥施下深耕後，立即下種或經一日或二日後播種，下種後再予深耕一次，自整地至下種一共耕耘三次。土壤耙平後，用十三齒的手耙割行溝，利用四個竹頭約長七臺寸，尖端削好，二個接於兩端齒，中間等距接兩個，割溝一次四行，一行供重複。行距三十五公分，深一英寸半。播種分行撒及叢播。行撒用竹桶鑽洞分行地搖，撒叢播每穴七八粒，穴距二十五公分，兩者用

我在初秋栽培蘿蔔

水稻二次除草及二次施肥後可說是農閒時期，因爲此時爲水稻生長管理上需要勞力最少的時候。如嘉南地區，假如處在水旱田均有農村裏，在此時期種種短期作物，像根菜類的蘿蔔，其收益不僅可彌補青黃不接時的家計，而且對此盈餘的勞力得以充分運用。譬如八月中旬下種，九月底收穫，爲期僅五十天左右，收穫時水稻剛抽穗，勞力支配甚爲恰當。

(1) 整地與下種：

整地：先選用沙質壤土而不積水，頭次翻耕前，用四十% 「阿特靈」可濕性粉劑加水二百一三百倍，用灑水桶平均洒施於地面，立即用犁翻耕混入土中，以防地下害蟲，但播種地假如是菜園或十字花科連作地，用氯化鈣於播種一星期前均撒地而隨即翻入土，以兼消毒土壤，減少病蟲害。五日後均撒堆肥(每分地三千臺斤)、過磷酸鈣(每分地三十臺斤)、水肥(每分地三千斤)，並隨即深耕，深度最好一、二臺尺以上。

下種：基肥施下深耕後，立即下種或經一日或二日後播種，下種後再予深耕一次，自整地至下種一共耕耘三次。土壤耙平後，用十三齒的手耙割行溝，利用四個竹頭約長七臺寸，尖端削好，二個接於兩端齒，中間等距接兩個，割溝一次四行，一行供重複。行距三十五公分，深一英寸半。播種分行撒及叢播。行撒用竹桶鑽洞分行地搖，撒叢播每穴七八粒，穴距二十五公分，兩者用