

問題，是經濟栽培必定要做的工作，在施肥方面，和其他桃、李等果树差不多，實際應用上，首先要看土壤本來的肥瘠情形，最後才能決定肥料要量之增減。梨星病蟲害方面，近來比較嚴重，特別是梨之黑星病和黑斑病，發生甚普遍，影響生育甚鉅，雖然如此，但現在不難防治。

苗木問題，可逕洽新竹縣政府農務課。

梅、喜好溫暖的氣候，寒暖變異性較大的地區，不適於栽培，最理想的經濟生產地帶，年平均氣溫應氏十二度到十五度，最低不能低於零下四度，某於此種因素，烏菜不是經濟的生產地區。（土林園所吳樹系主任葉鴻鵠）

魚養

各種水草均可冷藏

【問】：(1) 各種水草採收後予以冷藏保証適當溫度是否廣久不壞，會不會影響品質？

(2) 某些水草是否不宜冷藏，有那些？

(3) 各種水草冷藏時其保持冷度及冷藏時間是否需加限制，本省有無是項試驗紀錄？

(4) 水草經冷藏取出後，其自然腐爛程度是否會比未經冷藏者快速？(彰化溪州鄉南州大華路二十一巷十四號陳殿齋)

【答】：(1) 各種水草採收後予以冷藏可以減少冷藏庫中庫溫之急變，延長其貯藏之時期，對於品質有好的影響，但並不能永久不壞。

(2) 沒有不宜冷藏之水草。

(3) 各種水草冷藏時其保持冷度及冷藏時間自應依水草種類而異，各大農場及有冷藏庫之處均應有此項試驗紀錄。

(4) 由冷藏庫取出之水草比未經冷藏者，腐敗更快。(陳克終)

【問】：(1) 本人對漁業甚感興趣，但苦於找不到魚苗，不知何處可購到整批魚卵或大量魚苗？

(2) 欲小規模養殖，如何減輕成本？

(3) 泥鳅是否會從地下延地下水逃跑？(彰化縣鹿港鄉上林村溝東五十八號黃況秀)

農耕隊

中菲農耕隊員

視需要公開招考

中洲牌 小型輕便 碎土除草機

用途：

菸草稻田內碎土（菸溝）及菜園碎土用，稻田、香蕉園、菜園、葡萄園、鳳梨園及各種果樹園除草用。

規格：

(1) 身長3臺尺(2) 身高2臺尺半(3) 體重80臺斤(4) 馬力：2-3-5馬力

性能：碎土情形：深淺可任意調整最深6臺寸，刀片可依情形調節，最寬1尺5寸最小4臺寸。

除草情形：草連根同時除去，每小時約1分地。

■ 本機注意事項及操作 ■

- ① 引擎及車身黑油不可缺少，應在使用前添加。
- ② 操作速度如下：(1速(硬土使用約每小時1分地)
二速(軟土使用約每小時1分2厘地)
跑路速(為走路用)
- ③ 碎土刀輪停止及轉動可任意操作在本機右上方。

好大▲ 本行為慶祝創立12週年，有贈送品並將T6型每臺5仟元大優待請提早購買，勿失良機。

消優▲ 請注意：現時各牌子很多是不是實用還不知，但是中洲牌有多年以上經驗本行保證實用，請認明中洲牌以免受騙。

中洲行：臺中市復興路三段503號
(臺中酒廠新門對面)

【問】：(1) 各種水草採收後予以冷藏保証適當溫度是否廣久不壞，會不會影響品質？

(2) 某些水草是否不宜冷藏，有那些？

(3) 各種水草冷藏時其保持冷度及冷藏時間是否需加限制，本省有無是項試驗紀錄？

(4) 水草經冷藏取出後，其自然腐爛程度是否會比未經冷藏者快速？(彰化溪州鄉南州大華路二十一巷十四號陳殿齋)

【答】：(1) 各種水草採收後予以冷藏可以減少冷藏庫中庫溫之急變，延長其貯藏之時期，對於品質有好的影響，但並不能永久不壞。

(2) 沒有不宜冷藏之水草。

(3) 各種水草冷藏時其保持冷度及冷藏時間自應依水草種類而異，各大農場及有冷藏庫之處均應有此項試驗紀錄。

(4) 由冷藏庫取出之水草比未經冷藏者，腐敗更快。(陳克終)

【問】：(1) 農耕示範隊何時招考，是否每年一次？

(2) 報考者需具何種資格？

(3) 有無招考專科以上之隊員？

(4) 招考簡章向何處領取？

(5) 我已正式錄取，為何尚無消息？(彰化坪頭鄉大湖村張樹城，虎尾郵政七八一五號蔡美源)

爲害水稻的浮塵子飛蟲

請趕快使用速效性、效果大

正豐牌

永利農乳劑



正寶殺乳劑

品質正確



效果優良

正豐化學股份有限公司

霧峯：電話63

料，主要不可太繁華。
(三)所說八月中旬
四落花生臺南產
有售，每公斤十元
斤以上。(王玉崑)

臺南五號播種特性

釋八百倍所需原
藥藥量為六十六
•一四西西 C



風行世界！1968年大豐種子新貢獻！
農業繁榮之甘藷新星！

みくに初夏蒔エース甘藍

全日本10月種甘藍コンクール最高優位入賞
囊括所有甘藍之特點耐病・耐暑・耐腐・葉質柔軟・糖分多亦有適當之水氣食之甜柔可口不裂球耐貯藏運送最適合內外銷之好品種中北部2~9月中旬南部2~10月隨時可播種極早生而收穫多育苗期35~30天每分地3,600株移植後55天收穫平均2Kg約3.5臺斤極易栽培市場佔價高可得到濃厚利益已於全省各地先期栽培農家之好評推舉值得一試最新優良品種

「該作樣品及善璽報圖書附呈回郵備索」

全省各大種子行均有分售其他備有各項優良種子供應

食心油菜花	大葉サラダ萵苣	花裡摩斯球型洋葱	試文八號白菜	美國交配	長岡交配
大型北京結頭菜	美國黃葉洋芹菜	五〇〇九 美麗華盛頓蘆筍	美國洋蒜(リーキ)	美國土牌	美國土牌
大型北京結頭菜	美國黃葉洋芹菜	五〇〇九 美麗華盛頓蘆筍	美國洋蒜(リーキ)	美國土牌	美國土牌

總經銷郵政劃撥：12839-40277
總經銷地址：高雄市七賢二路六二號 TEL 21488
總經銷地址：高雄市建國三路二一九號 TEL 22834

答：(一)中菲技術合作委員會招考農耕隊員，視實際需要而定，並非每年舉行，招考時必在各大報登載公告，請隨時注意。
(二)報考者應具備下列各項資格：(1)高級農職校以上男性畢業生年齡未滿卅五歲，已服役者。(2)最近連續三年實際從事農事工作有證件者。身體健康，容貌端正，品德優良，確能克苦耐勞者。
(三)專科以上學校畢業，具備下列條件，即可報考。
四招考簡章可於報名前向臺北市基隆路八十四號中菲技術合作委員會索取。
凡報考後正式錄取將經體格檢查合格者，請靜候通知前來參加受訓。(中菲會朱永康)

(二) 幼穗形成期是指什麼時候？
斷水三至五天即可嗎，其斷水程度如何？
水稻稱肥在什麼時期施下最適，氮素和鉀素各若干量？


(五) 肥料使用量本期作每公頃氮素九十公斤時，合硝酸鑑氮成分二十多%，則需此肥料四五〇公斤，其計算法九十除〇·二對嗎？
(六) 普通農藥箱為十四加侖是美加侖還是英加侖？
美加侖，例：安特爾乳劑八百倍水溶液要多少藥量，其計算方法如何？

【答】：(一) 臺南五號的有效分蘖第一期作插秧後約三十八至五十天左右，第二期作插秧後約二十八至三十天左右，最高分蘖期第一期作插秧後五十至五十五天左右，第二期作插秧後三十五至四十五天左右，所說九十日蓬萊米未知何品種，歉難答覆。
(二) 幼穗形成期是指出穗前二十五天，就是該品種自插秧至出穗期之日數減二十五天就是幼穗形成期，及其母莖幼穗長〇·二公分 (尤是幼穗形期用)

風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

フェニトラン
肥豚樂 針 C西京味1012味

C:\Users\10128\



- ①防止貧血引起的發育不良症。
 - ②迅速增加體重30~50%。
 - ③防止哺乳期間之下痢與肺炎。
 - ④改進體質而增加抵抗力。
 - ⑤出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)。

社ニパニ株式有限公司會製藥一城岩日本美國ヘリソントン貿易總經銷處臺灣

最新博濟禽畜藥品手冊
最內容每頁各種疫
病與各種新舊藥品
第四本，十月一日發行
免費贈送「付二元郵票」

