



## 瓜西

### 小風西瓜密植 分地三千株

【問】：(一)小風西瓜在二期作後是否可種，若欲冬種或春種何月播種？  
(二)對於栽培管理是否與西瓜一樣？

【答】：(一)可以種植。在一月至二月間結果者品質不好，故冬春應在十一月前播種，春作在二月以後播種較理想。

【問】：(一)可稍密植，一分地可種三千株，結果期不可多灌水，其他相同。  
(二)約七十天左右可採收。(陳文仰)



## 蔬菜

### 南部種番茄

九月至一月

【問】：(一)南部種番茄，在何種播種最好？  
(二)種番茄的土壤以何種質地最好？  
(三)行株距需要多寬才適合？

四番茄種後，是否須要插竹作支柱？  
(四)何品種產量高？  
(五)黃麻採收後種西瓜是否適合？(臺南市安南區土城東里九十三號碧裕)

【答】：(一)南部種番茄的播種期為八月下旬至二月上旬，以九月中旬至一月中旬為最適。

(二)栽培番茄最理想之土壤為土層深厚，排水良好，有相當保水力之砂質壤土以至粘質壤土為宜。

(三)植株高大之品種或在日照不足及濕季栽種時，植距宜較大，而畦寬一·五公尺，株距○·五公尺。如欲提高早期收量，或日照充足時，或乾旱瘠薄之地，或株形矮小之品種，植距宜較小，即畦寬一·三公尺，株距○·四五公尺。

(四)在支柱材料缺乏之田面積種植缺乏勞力時或灌水困難時可行為放任栽培，反之如欲集約栽培以插立支柱，即整枝栽培為有利。

(五)媽娜露西或農友雜交一號。

(六)黃麻採收後種植西瓜不甚適合。(李樹泉)

## 果樹

### 臺北烏來附近山地 可種橫山梨四季梨

【問】：(一)烏來附近山地種梨子是否可以？  
(二)栽植梨樹行株距多少為適，如何施肥修剪，易生何種病蟲害？  
(三)若種梅子或枇杷是否合適此地氣候？(臺北縣林口鄉菁湖村中湖三之一號林金田)

【答】：(一)臺北縣烏來附近山地，只可以種植橫山梨或四季梨等。至於新世紀，廿世紀，長十郎等品種，一定要栽植在海拔一千七百公尺以上地區不可，否則，冬季過暖，休眠不足，難以有正常的開花結實。



(二)栽植梨樹行株距多少為適，如何施肥修剪，易生何種病蟲害？

(三)若種梅子或枇杷是否合適此地氣候？(臺北縣林口鄉菁湖村中湖三之一號林金田)

【答】：(一)臺北縣烏來附近山地，只可以種植橫山梨或四季梨等。至於新世紀，廿世紀，長十郎等品種，一定要栽植在海拔一千七百公尺以上地區不可，否則，冬季過暖，休眠不足，難以有正常的開花結實。

(二)栽植梨樹行株距多少為適，如何施肥修剪，易生何種病蟲害？  
(三)若種梅子或枇杷是否合適此地氣候？(臺北縣林口鄉菁湖村中湖三之一號林金田)



## 八江農藝「新黑田五寸人參」更換商標

### 敬告全省種子同業、農友啟事

茲敝社生產新黑田五寸人參(胡蘿蔔)行銷各國品種優良名聞遐邇。在本省銷售三年來，因品種豐滿、色澤鮮麗、收量特豐，受全省農戶絕大多數愛用。將以前在臺灣普通種植的人參品種銷量淘汰，凡是採用人參種子，均指明敝社出品貨感謝萬分。

現有同業為求魚目混珠銷售，採用同名「新黑田五寸人參」更有將商標顏色和圖樣全部仿印，敝社為求優良品種不被劣種所累，不得不將原已行銷之原商標予以取消，改用新商標以防假冒。敬請採用時勿以圖樣顏色為準，定要十分認明「豐滿·鮮麗」

YAE SEED 八江農藝株式會社等字  
辛。採購，以免誤購影射生產為幸。

日本長崎縣早市摩生町  
八江農藝株式會社  
臺北市迪化街一段86號

臺灣總代理 臺灣農產企業公司

謹啟

品質創造信譽·信譽保證品質

## 燕子牌農藥



### 產品項目

劑劑粉灰粉劑劑劑劑劑劑劑劑  
粉粒濕性石性濕乳劑劑劑劑劑劑劑劑劑  
C C 可生可P松殺多融靈青  
H H C 樂賽V拉丹普滅滅速敵  
B B H C 馬D拉丹普滅滅速敵  
B B H C 馬D拉丹普滅滅速敵  
B B H C 馬D拉丹普滅滅速敵

有登記證  
所有產品均

劑劑劑劑劑劑劑劑劑劑劑劑  
乳乳乳液液液液液液液液液液  
松松松農農農農農農農農農農  
農農農農農農農農農農農農  
特巴順新D

順益化學股份有限公司

臺中縣清水鎮南街一號 電話：45·341號