西瓜

小鳳西瓜密植分地三千株

【問】：㈠小鳳西瓜在二期作後是否可種，若欲冬植或春植何月播種？㈡對於栽培管理是否與西瓜一樣？㈢種植後需時多久才可收穫？（屏東高樹鄉東海村十七號陳進逸・雲林大埤鄉簡俊雄）



【答】：㈠可以種植。在一月至二月間結果者品質不好，故冬季應在十一月前播種，春作在二月以後播種較理想。㈡可稍密植，一分地可種三千株，結果期不可多灌水，其他相同。㈢約七十天左右可採收（陳文彬）

菜蔬

南部種番茄　九月至一月

【問】：㈠南部種番茄，在何時播種最好？㈡種番茄的土壤以何種質地最好？㈢行株距需要多寬才適合？㈣番茄種後，是否須要插竹作支柱？㈤何品種產量高？（嘉南市安南區土城東里九十三號碧裕）

【答】：㈠南部番茄的播種期爲八月中旬至二月上旬，以九月中旬至一月中旬爲最適。㈡栽培番茄最理想之土壤爲土層深厚，排水良好，有相當保水力之砂質壤土以至粘質壤土爲宜。㈢植株高大之品種或在日照不足及濕季栽種時，植距宜較大，而畦寬一・五公尺，株距〇・五公尺。如欲提高早期收量，或日照充足時，或乾旱瘠薄之地，或株形矮小之品種，植距宜較小，即畦寬一・三公尺，株距〇・四五公尺。㈣在支柱材料缺乏大面積栽種缺乏勞力時或灌水困難時可行放任栽培，反之如欲集約栽培以插立支柱，即整枝栽培爲有利。㈤媽娜露西或農友雜交一號。㈥黃蔬採收後種植西瓜不甚適合。（李樹泉）

果樹

臺北烏萊附近山地可種橫山梨四季梨

【問】：㈠烏萊附近山地種梨子是否可以？㈡栽植梨樹行株距多少爲適，如何施肥修剪，易生何種病蟲害？㈢若種梅子或枇杷是否能適應此地氣候？（臺北縣林口鄉菁湖村中湖三之一號林金田）



【答】：㈠臺北縣烏萊附近山地，只可以種植橫山梨或四季梨等。至於新世紀，計世紀，長十郎等品種，一定要栽植在海拔一千七百公尺以上地區不可，否則，冬季過暖，休眠不足，難以有正常的開花結實。㈡栽植橫山梨等，每公頃約五百至六百株（十四尺×十四尺）。其他如施肥修剪等

八江農藝「新黑田五寸人參」更換商標

敬告全省種子同業、農友啓事

茲敝社生產新黑田五寸人參（胡蘿蔔）行銷各國品種優良名聞遐邇。在本省銷售三年來，因品種豐滿、色澤鮮麗、收益特豐，受全省農戶絕大多數愛用。將以前在臺灣普遍種植的人參品種銷量陶汰，凡是採用人參種子，均指明敝社出品實感謝萬分。

現有同業爲求魚目混珠銷售，採用同名「新黑田五寸人參」更有將商標顏色和圖樣全部仿印，敝社爲求優良品種不被劣種所累，不得不將原已行銷之原商標予以取銷，改用新商標以防假冒。敬請採用時勿以圖樣顏色爲準，定要十分認明 豐滿・鮮麗 YAE SEED 八江農藝株式會社等字幸。

新黑田五寸人參 ヤエタネ

採購，以免誤購影響生產爲

日本 長崎縣諫早市厚生町
八江農藝株式會社 謹啓
臺北市建化街一段86號

臺灣總代理
臺灣農產企業公司

品質證保譽信・譽信造創質品

燕子牌農藥

產品項目	
粉劑	粉劑
濕性石灰乳	粉劑
可生P松乳	劑劑
CCC樂馬VD拉丹乳	劑劑
HHC賽乳	劑劑
BBB西D馬	劑劑
殺多益靈青	劑劑
普滅滅速敵	劑劑
益大好效殺	劑劑
乳乳液	劑劑
松松農減T	劑劑
農拉米掃	劑劑
特巴順新D	劑劑

有登記證所有產品均

順益化學股份有限公司
臺中縣清水鎮鎮南街一號　電話：45・341號