

【答】：(一)中非技術合作委員會招考農耕隊員，視實際需要而定，並非每年舉行，招考時必在各報登載公告，請隨時注意。

(二)報考者應具備下列各項資格：(1)高級農藝學校以上男學生年滿十六歲，已服後者。(2)最近連續三年實際從事農事工作有證件者。身體健康，容貌端正，品德優良，確能刻苦耐勞者。

(三)專科以上學校畢業，具備下列條件，即可報考。

(四)招考簡章可於報名前向臺北市莊隆路八十四號中非技術合作委員會索取。

(五)凡報考後正式錄取而體格檢查合格者，請候通知前來參加受訓。(中非會朱永康)

豆 綠

臺南選一號綠豆

豆種何處有售？

【問】：(一)綠豆品種臺南選一、二號種子何處有售，若間苗太密應如何處理？

(二)綠豆每公頃施肥多少為適？

(三)種植時期八至九月是指何曆？

【答】：(一)綠豆品種臺南選一、二號種子臺南區農業改良場現有種植，但數量無多可少量無償供試，市面無種植，又難買到。間苗太密可拔開，每十公分左右留一株。

(二)肥料如土壤不過份瘠薄時，可不必施肥，但普通每公頃施硫酸銨一百至一百五十公斤，過磷酸鈣二百至三百公斤，氯化鉀一百至一百五十公斤，如施堆肥可減少化學肥料，主要不可太繁茂。

(三)所說八月中旬至九月中旬是指國曆。四落花生臺南選九號種子臺南區農業改良場有售，每公頃十元一角，但需要購買五十公斤以上。(王玉崑)

稻 水

臺南五號播種特性

【問】：(一)臺南五號和九十一號蓬萊尖的有效分蘗是不是都在四十五天內，其最盛分蘗是三十天或三十五天？

(二)幼穗形成期是指什麼時候？

【答】：(一)臺南五號的有效分蘗第一期作插秧後約三十八至四十天，第二期作插秧後約二十八至三十天，最高分蘗期第一期作插秧後五十五至五十五天，第二期作插秧後三十五至四十天，所說九十一號蓬萊尖未知何品種，歡迎答覆。

(二)幼穗形成期是指出穗前二十五天，就是該品種自插秧至出穗期之日數減二十五天，就是幼穗形成期，或其母草幼穗長〇.二公分時，就是幼穗形成期。

(三)第一期作插秧後四十天，第二期作三十天以後分蘗者為無效分蘗。其斷水(即晒田)在有效分蘗以後至初穗形成期前為宜，晒田的程度要看土質及周圍條件而有異，通常晒至路進田中尚稍留足跡程度或稍為開始龜裂之程度。

(四)在幼穗形成期(即母草幼穗長〇.二公分時)施用，其施肥量要視水稻缺肥情形而定，一般施肥量每公頃硫酸安六十公斤左右，氯化鉀三十公斤左右。

(五)不錯，肥料量等於所需肥料要素量除以肥料成分。


(六)農藥之藥量計算普通用美加侖，一加侖等於三.七八公升，安特靈乳劑稀釋八百倍所需原藥量為六十六.二四西西(〇.〇〇六六六)。



風行全世界！最新發育，育肥，促進劑！
貧血預防，育肥迅速增加體重劑

フェニトラン 肥豚樂 針

(農畜字1012號)



說明書索

- ①防止貧血引起的發育不良症。
- ②迅速增加體重30~50%。
- ③防止哺乳期間之下痢與肺炎。
- ④改進體質而增加抵抗力。
- ⑤出生四日前後的小豬一隻一管(1cc)。

製造元 日本 岩城製藥株式會社
提 携 美國 ヘンリー・アンド・カンパニー
臺灣總經理處 博濟貿易有限公司
臺北市武昌街2段91巷1號 電話36148

免費贈送「付二元郵票」最新博濟畜禽藥品手冊
第四本，十月一日發行「內容豐富 100 頁各種疾病與各種新藥品之介紹」每人限一冊。

風行世界！1968年大豐種子新貢獻！
農業繁榮之甘藍新星！

みくに配 初夏蒔エース甘藍

全日本10月穫甘藍コンクール最高優位入賞

囊括所有甘藍之特點耐病・耐暑・耐腐・藥質柔軟・糖分多亦有適當之水氣食之甜爽可口不裂耐貯藏運送最
適合內外銷之好品種中北部2~9月中南部2~10月隨時可播種極早而生收穫多育前期35~30天每分地3,600
樣移植後55天收穫平均2Kg約3.5臺斤極易栽培市場佔
價高可得到濃厚利益，已於全省各地先期栽培農家之好評推舉值得一試最新優良品種

[試作樣品及美麗說明書附足回郵備索]

全省各大種子行均有分售其他備有各項優良種子供應

美國 大葉サラダ苣	美國 長崎交配	美國 試交八號白菜	美國 花裡摩斯球型洋蔥	美國 五〇〇九	美國 美麗華盛頓蘆筍	美國 洋蒜(リーキ)	美國 黃葉洋芹菜	美國 大型北京結頭菜
--------------	------------	--------------	----------------	------------	---------------	---------------	-------------	---------------

總代理 三貿易有限公司 高雄市中區二二路六二號 TEL 21488
經銷 大豐種子行 高雄市中區三三路二一九號 TEL 22834
郵政劃撥：12839・40277