

乾莖(倒伏) 黃萎病 窒息病 穗稻熱病 穗紋枯病 未熟落果

必須使用

健穠素

50瓦裝
批價20元

開根素

45瓦裝
批價15元

才能治療

各位農友！

這數年來水稻到出穗前後即患乾莖等如上記之各種怪病，噴灑稻熱病紋枯病等農藥也未能見效，這是因缺乏某種要素所引起的天然植物荷爾蒙分泌作用失調，所致之「未老先衰」現象，所以噴灑健穠素或開根素即可預防，如農藥中滲本品亦可治癒。

五年來之推銷經驗已證明效果確實，請安心使用，如出穗後有噴灑本品可使稻穗豐滿增收甚多，配方如下：

- ①水15公斤
- ②健穠素或開根素7瓦
- ③尿素2兩
- ④稻熱病或紋枯病藥
- ⑤非肥皂粉10瓦

上記配方5日噴灑一次，2—3次即完全治癒

天力化學工業股份有限公司

臺北縣中和鄉景平路47之2 電話923111

郵政劃撥 5179 電報掛號 1199

(偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金)
5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔
安全迅速方便無論一包二包無任歡迎

此外，假莖上紅色素較濃，種植於亞熱帶時發生四季性形態不同的蕉果也是一大特色。卡蕉品種包括許多品系，若依植株高矮及葉片寬狹（即葉片長寬比的大小）來劃分，卡蕉可以分成四個重要品系，最高的叫馬蕉，次高的叫羅蕉，再次叫高卡蕉，短小的叫矮卡蕉。每一個品系裏，還可分出好些個亞品系。

馬蕉是卡蕉中最高的品系，植株高度較格略小，外觀也較高大的格蕉柔弱而色素較深。馬蕉除了高大外，葉片也寬，長寬比約為三·〇—四·一，比格蕉能適應較差的土壤及能抗巴拿馬病。最大的特色是果實催熟時着色不佳，在冬天經常帶有明顯的青色，所以有人稱之為青熟蕉，中美的牙買加就種有這種馬蕉品系。

羅蕉也是卡蕉品系之一，與前述馬蕉極為相似。只較馬蕉短約半公尺，葉片也較狹，長寬比為二·三—三·一，果房較馬蕉大，果手也較馬蕉平均多出半手，但果指却較馬蕉為小，是卡蕉中最優良的品系。羅蕉在中美洲的多明尼加、西印度羣島，南太平洋的菲律賓等地都有栽培。

高卡蕉是卡蕉中較短小的品種，葉片更短，長寬比只有二·一—二·六。高卡蕉的果指是卡蕉裏最大的一個品系，冬天冷涼時節仍然可以維持正常抽花，不過抽長與果指飽滿所需的日數較長。澳洲種的就是高卡蕉品系，從好多特性看來類似本省的仙人蕉，只是植株略矮了些。

矮卡蕉顧名思義是卡蕉裏最矮小的品系，通常假莖高度只及仙人蕉的一半，葉片短而寬，長寬比約為一·八—二·二。據稱矮卡蕉係由高卡蕉突變而來的品系，假莖矮小可以減少颱風倒折，套袋作業也很方便，但是冬季冷涼時果房抽出假莖外，發生所謂「難產」的現象，這却是栽培上一大難題。本省的三尺蕉、矮腳蕉就是屬於這一品系的。

我們所要注意到的是，無論卡蕉裏任一個品系，馬蕉、羅蕉、高卡蕉或矮卡蕉本身都有許多突變的亞品系存在，有的色素較深，有的雙穗，有的比較強壯有的比較柔弱，從形態上來省本的仙人蕉似應是羅蕉中的一個亞品系。

本省的仙人蕉是本省亞熱帶氣候下的馴化品系，是卡蕉品種裏的一個品系，在先天上具備了卡蕉的優點與短處。在單株產量上雖不足以與中美洲的格蕉抗衡，但我們若能加強高產優良品系的選擇，將來一定可以減少這種產量上的差距的。在葉斑病抗病力上也較格蕉為弱，這意味著我們對葉斑病防治的工作，不但應當加強，而且應當較中美洲的格蕉蕉園更要貫徹，因為我們的仙人蕉抗病力較差呀！在耐貯運性方面，格蕉也比仙人蕉要強一些，但我們離開市場較近，完善的冷凍運銷系統和加強冷凍船就是以前補這一缺點。

仙人蕉與格蕉催熟後果色不同，但誰優誰劣完全是消費市場與消費者的習慣，對於果肉品質並無影響，依傳統習慣我們有理由相信亞洲市場仍是習慣於仙人蕉的果色。土壤性巴拿馬病是栽培格蕉的限制因子，熱帶性氣候與肥沃深厚的土壤也是格蕉所必要的栽培條件，而仙人蕉先天對巴拿馬病具免疫力並適合本省亞熱帶氣候與土壤，這都是我們不能選種格蕉而必需繼續栽培仙人蕉的原因。